

The image shows the front cover of a book. The cover is decorated with a marbled paper pattern in shades of blue, green, and yellow. A gold-colored border frames the title area at the top. The text on the cover is in Icelandic and provides information about the school and the report's period.

Bodsrit Bessastada skóla
1845

Leidarvísir
að þekkjá stjórnur I
Skólaskýrsla 1844 - 1845





B o d s r í t

til að hlusta á

Þá opinberu yfirheyrslu

i

Besastada Skóla

þann 22—28 Maí

1845.

-
1. Seidarvísir til að þekkja sjornur. Þyri parturinn.
Saminn af B. Gunnlaugessyni.
 2. Skólaskýrsla, saminn af *Lector Theol.* J. Jónes-
syni, R. af Dbr.
-

Reykjavík 1845.

Prentað á kostnað Besastada Skóla,
af Selga Selgassyni.

Y f i r l i t

fyrra partsins af þessum leidarvisi.

Sungáangurinn.

Fyrsta grein um stjörnurnar yfir hásud.

Önnur grein um norðurmerkin.

1. Björn hinn mikli.
2. Björn hinn minni, og aðferð til að finna norðrið.
3. Kafslopa.
4. Greindýrið.
5. Vinvidargatirinn.
6. Cepheus.
7. Norðurdröfinginn. Um sólbrantarmöndul.
8. Andrómeda.
9. Perseus og Medúsuhöfuðið.
10. Þríhyrningarnir.
11. Skumadurinn.
12. Kamelýardus.
13. Tigrisdýrið.
14. Ljón hið minna.
15. Nautamadurinn og Mánalfjallið.
16. Veidihundarnir.
17. Bernikuhaddur.

18. Norðurkórónan.
19. Garpan. Þar er sýndur máti að vita,
hvad frammordid er af Blástjörnu og
Sjóstjörnu, og yfir höfund að snúa
stjornutíma í sóltíma.
20. Serkúles og Cerberus.
21. Nadurvaldi og Nadurinn.
22. Orinn og Antínóus.
23. Sobjeskýs Skjöldur.
24. Róngruflinn.
25. Orin, Refurinn og Gæsin.
26. Söfrungurinn.
27. Svanurinn.
28. Serfættlan.
29. Pegasus. Máti að finna verkniút.
30. Solinn.
31. Fridriksheidurinn.
32. Serchelsjónpípan.
33. Múrfvadranturinn.

Í síðara parti þessa leidarvísis er áformað að lýsa
dýrareiminni, og að því búnu sudmerkjum þeim, sem há-
anleg eru frá Íslandi.

Leidarvísir

til

ad þekkja stjörnur.

Til ad læra ad þekkja stjörnurnar, er best í fyrstu ad hafa augastad á þeim stjörnum, sem alþýðu eru kunnugar, so sem eru Stóri Bagninn, Sjóstirnid, Þjóðakonurnar, Þjóðakallarnir, og Blástjarnan, og færa sig smá saman út frá þeim, eins og þessi litli ritlingur tilvísar. Það, sem hér er talad um, eru Þyrðarstjörnurnar, eða sólstjörnurnar, um hvorjar talad er í 11ta og 12ta Kap. í Ursins Stjörnufræði, er náttúruspekingur Jónas Hallgrímsson hefur á Íslensku snúid; ætlast jeg til, ad lesarinn eigi hana, og hafi við höndina, þegar hann les þenna minn leidarvísir.

S y r s t a g r e i n

um stjörnurnar yfir höfud.

Ætíur því, hvad stjörnurnar sýnast stórar, adgreina menn þær í stjörnur fyrstu stærðar, so sem Blástjörnuna, annarar stærðar, þær sem þeim ganga næst, so sem Bagnstjörnurnar. Med þerum augum sjá menn venjulega smæst þær, sem eru Ötu stærðar. Þær, sem smærri eru, nefna menn sjónþípustjörnur (telescopistar), vegna þess þær einasta sjást med sjónþípum.

Þ þessum leidarvísi teikna jeg stærdir stjarnanna með innilokadri tölu, so sem (1), (2), (3), o. s. frv.

Eptir affstöðunni skipta menn stjornunum í merki eða flokka, og merkjunum skipta menn í norðurmerki, dýrareimarmerki og súðurmerki. Norðurmerkin eru þau, sem liggja fyrir norðan dýrareimina, og nefnast þannig :

Björn hinn mikli, Björn hinn minni, Kassiópea, Hreindýrid, Vínvidargættirinn, Cepheus, Norðurdrekinn, Andrómeda, Perseus, Medúsuhofudid, Þríhyrningarnir, Ólumadurinn, Kamelpardus, Tigrisdýrid, Ljónid hid minna, Nautamadurinn, Mænalfjallid, Beidihundarnir, Bernikuhaddur, Norðurkórónan, Harpan, Herkúles, Nodurvaldinn, og Nodurinn, Drinn, Antínóus, Sobjeshéskjöldur, Kóngsurinn, Drin, Refurinn, Gæsin, Höfrungurinn, Svannurinn, Fersættlan, Pegabus, Follinn, Fridriksheidurinn, Herschelsjónpípan, Múrboadranturinn.

Þ dýrareiminni (Zodiacus) eru þessi merki: Kruturinn, Urinn, Lofburarnir, Krabbinn, Ljónid, Tómfurinn, Netin, Sporddrekinn, Bogmadurinn, Steingeitin, Vatnsberinn, Fiskarnir.

• Súðurmerkin, er liggja fyrir sunnan dýrareimina, eru þessi: Hvalurinn, Eridanusfljótid, Veldisprotinn, Sérinn, Stóri og Litli Hundurinn, Einhyrningurinn, Skipid Argó, Vatnsnadirinn, Sextantinn, Bilkarinn, Hrafninn, Loftskipid, Einverufuglinn, Kotturinn. Þessi sjást frá Íslandi að mestu; enn so eru önnur, sem öldungis ekki, eða ómerkilega, sjást þadan; þessi eru: Uttavitinn, Loftfugan, Líkneskjasmidjan, Rafurmagnstólid, Ameríkugæsin, Sigurverkid, Litli Vatnsnadirinn, Tígulnetid, Grafallinn, Málarábordið,

Sverðsflurinn, Töbluffalid, Flugflurinn, Kamelinn, Sudurflugan, Krossinn, Centárus, Ulfurinn, Sirkillinn, Sudurpríhyrnflugurinn, Hornmátid, Reglustíkan, Altarid, Paradísarfuglinn, Sjónpípan, Sudurfórónan, Váfuglinn, Stækkunarglerid, Indíabúinn, Tranan, Dktantinn.

Önnur grein

um norðurmerkin.

I. Björn hinn mikli.

Þessi Björn er birna, og á eptir hinni grísku góðafræði að vera Kallistó Lykaonsdóttir, er Súppster elskadi, og átti með henni Arkas, er landid Arkadía fékk nafnid af. Súns breytti Kallistó í birnu; ætladi þá Arkas að stjóta birnuna, sem hann vissi ekki að var móðir sín, enn Súppster setti mæðgin þessi upp á himininn; eru þau sá stóri og litli Björn. Hinn stóri Björn er audþekktur af stjörnum þeim, er kallast stóri Þagninn, standa þær á búki hans og hala. Þegar Sjöstirnid er í austurátt, og Blástjarnan í vesturátt, þá er Þagninn milli norðurs og útnorðurs; heita þá stjörnurnar í honum frá austri til vesturs í röð eptir stofunum í grísku stafrofinu þannig: Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsílon, Zeta og Eta, og kennaft við stóra Björninn. Sumar af þessum hafa líka arabísk nöfn. Sú fyrsta, Alpha, heitir Dubhe, önnur Merak, 3ja Þheca, 4da Megrez, sú fimmta, eða Epsílon heitir Alioth, sú sjötta Mizar, og sú 7da Benetnasch eða Alkaid. Þessar allar eru aunarar stærðar, nema sú fjórða, sem er þriðju. Mizar er tvöstjarna, sjá Stjörnufræðina bls. 150. Bestan til við

Mizar er fimmtu stærðar stjarna, er heitir Alcor eða Riddari. Hinar fjórar austustu mynda Staflferhyrning lágan, breidari ofan enn nedan, og standa á búfi Bjarnarins; enn hinar aðrar í Wagninum eru á hala dýrsins. A hægra apturfætinum er Psi (3), í beinni línu niður á við frá Delta og Gamma; austar og nedar Omega (4), og þar fyrir austan á klónni tvær stjornur saman, báðar (3), er heita Lambda sú efri, og Miú sú nedri. A lærinu milli Gamma og Psi er Chi (4). Bestar og nedar, enn sú umgetna kló, er vinstra apturfótur klóin, líft lögud sem hin fyrri, Miú ofar og Xi nedar, (4), enn austar og ofar eru enn tvær stjornur saman á frammfótaklónni; heita þær stjornur Zóta sú efri, Kappa hin nedri, báðar (4); og standa eins af sér, sem hinar fyrri; er álíka langt frá frammfótaklónni til hægra apturfótur klóar, sem frá þessari til vinstra apturfótur klóar, og eru þær allar þrjár nær því í beinni röð. Austur undan Alpha og Beta er á hálfi dýrsins Ypsilon (4), nærri jafnlangt frá báðum þeim, og myndar jafnarmadan þrihyrning með þeim. A höfðinu þar fyrir austan og ofan eru margar smáar stjornur. A beinni stefnu austur frá Beta og Ypsilon er Omikron (4) á neðri inni; enn upp undan Ypsilon og Omikron eru þær mörgu smáu stjornur á höfðinu. Þær hét nefndu áttir gilda, þegar Wagninn er í áður umgetinni átt. Enn stundum kemst hann hjá oss í háloft sunnan til við hvirfipúnkt; er þá Sjóstirnid í útnordri, enn Blástjornan milli austurs og landnordurs; þá snýr höfud Bjarnarins í vestur, enn halinn til austurs; klærnar, sem áður snéru niður, snúa nú til sudurs. Hann snýst þann-

ig í fringum norðurmöndul jarðar, að höfundur geingur alltaf á undan, hriggurinn snýr ætíð að möndli, enn klærnar frá. Aldrei snerta lappir hans land né sjó á Íslandi, þar sem fjallalaust er. Stjörnurnar í honum eru því hjá oss möndulsvæðisstjörnur (circumpolares).

Það væri hér ekki úr veigi, að geta um vorknútsfjærd og miðbaugsfjærd (Ascensio recta og Declinatio) nokkurra stjarna í Vagninum, enn hvað þessar séu, má lesa í Stjörnufræðinni, bls. 149.

Vorknútsfjærdin stjörnunnar Dubhe, 1ta jan. 1845, er í boga $163^{\circ} 31' 55''$. Þegar þessu er deilt með 15, einö og seigir í Stjörnufræðinni, bls. 193, þannig:

$$15) \underline{163^{\circ} 31' 55''}$$

$$10 \text{ st. } 54' 7''$$

enn í kvótanum eru settar stundir í staðinn fyrir gráður, þá kemur fram stjörnutíminn, sem lídinn er frá því vorknútur var í miðdagshringi, og til þess Dubhe kemur í miðdagshring. Sá útkomandi kvóti kallast stjörnunnar vorknútsfjærd í tíð, so að vorknútsfjærd stjörnunnar Dubhe eptir stjörnutíma er 10 stundir $54' 7''$. Þar af flýtur, að stjarnan Dubhe er í efra hluta hádeigisbaugs 10 st. $54' 7''$ seinna, enn vorknúturinn; enn í nedra hluta 22 st. $54' 7''$ seinna, enn vorknútur er í efra hluta. Þess vegna verður $343^{\circ} 31' 55''$ miðbaugs í hágaungu, þegar Dubhe er í lággaungu. Það kalla jeg hágaungu (Culmination), þegar stjarna eða einhver himinpunktur geingur í gegnum ofanverðan miðdagshring, eða er í há-

subri. Líka falla jeg, að stjarnan hágáangi (culmine-
ri), þegar hún er í hásubri. Aftur á mótt falla jeg
lággaungu, þegar stjarnan er í midnættisstað, og er
það 12 stundum eða 180° eptir hágaunguna. Arlega
ver vorknútsfjærd stjörnunnar Dubhe um $57''$ í boga,
eða, þegar deilt er með 15, í tíð $3'',8$, eða nærfelbt
 $4''$, því $\frac{8}{10}$ er því nær 1. Af þessu sýtur, að Sjö-
stirnir er nærri í átt þeirri, er nefnist austur til sub-
urs (suburhólt austur), eða lítið úr midsmorgunstað,
þegar Dubhe er í nordri. (Samantætt tobluna, er
seinna kemur í þessum leidarvísi um stjörnutíma Sjö-
stirniskins í hmsum áttum, sjá lýðingu Hörpunnar).
Vorknútsfjærd stærstu stjörnunnar í Sjöstirninu, er heit-
ir Alkhone, er 3 stundir $38' 16''$, enn midbaugsfjærd
 $23^\circ 35' 29''$. Midbaugsfjærd stjörnunnar Dubhe er
 $62^\circ 37' 20''$ þann 1ta jan. 1845, enn mínkar áre-
lega $19''$. Með þessum hætti er

	Vorknútsfjærd	Árs- færsla	Midbaugsfjærd	Árs- færsla
Dubhe	10 stundir $54' 7''$	$4''$	$62^\circ 35' 20''$	$19''$
Alfoth	12 — $47' 11''$	$3''$	$56^\circ 48' 3''$	$19'',7$
Mizar	13 — $17' 33''$	$2''$	$55^\circ 44' 12''$	$19''$
Benetnasch	13 — $41' 25''$	$2''$	$50^\circ 5' 23''$	$18''$

Sér af sýtur, að stóri Þagninn er 2 stundir 47 mín-
útur 18 sekúndur að ganga í gegnum hádeigisbaug
eptir stjörnutíma; enn á sigurvefki, sem geingur eptir
midlungsfóltíma, eins og venjulegt er á Íslandi, ver-
ur þetta 2 stundir 46 mínútur 50 sekúndur.

Þó að stjörnurnar á höfði Þjarnarins séusmá-
ar, þá eru þær þó í því tilliti merkilegar, að þær
ganga rétt yfir hvirfil á Íslandi. Það eru þær,

sem standa í kringum vinstra auga Bjarnarins. Sé dreigin stefnulína frá Delta í vestur, laust fyrir nedan Dubhe, þegar Þagninn er á landsudurlöpti, þá hittir sú lína fyrst stjörnu (4), er nefnist latínsla litla h, á kjálkabardi Bjarnarins, álíka langt frá Dubhe, sem Dubhe er frá Delta. Því næst mætir sú sama lína stjörnu (5), er heitir Lá, stammt fyrir vestan h. Þar næst geingur sama línan nedan til við stjörnu (5), sem heitir latínsla í stóra Bjarnar. Enn fyrir vestan í eru þrjár stjórnur nærri saman, heitir sú austari efri 1 Þí (5); sú austari nedri 2 Þí og er (6). Sú vestari heitir stóra latínsla A stóra Bjarnarins, enn auga hans er á milli í og Þí, þannig að í er við austara augakrókinn, enn 1 Þí við hinn vestara. Stjarnan A er álíka langt vestur frá Dubhe, sem Dubhe er frá Altoth.

	Vorknúts- sjærd.			Midbaugs- sjærd.		
	ft.	m.	f.			
A Stóra Bjarnar (6)	8	20	40	65°	40'	12"
1 Þí eða vestari augakrókur í Bjarnarins eða austari augakrókur	8	25	22	65°	33'	1"
2 Þí nedan við augnakróf h Bjarnarins eða kjálkabard	8	43	15	65°	11'	41"
Lá Bjarnarins	8	26	40	64°	51'	54"
Þóta, efri frammló	9	19	14	63°	44'	12"
Kappa, eystri frammló	8	58	7	64°	8'	30"
	8	48	36	48°	39'	5"
	8	53	1	47°	46'	5"

Af þessum midbaugsfjærdum má sjá, að A stóra Bjarnar geingur yfir Þéradsflóa, Mývatn, Alureyri, Steingrímsfjærd, Þrostansfjærd og Lálfnaarfjærd.

1 Þí yfir Hvalvík, Múnlapverá, Þingeyra og Bardaströnd. í Bjarnarins yfir Hellisfjörð, frammdali norðurlands, og innanverðan Hvammssfjörð.

2 Þí yfir Stöðvarfjörð og Snæfellsnes. Lá Bjarnarins yfir Breidamerkursand og Kenkjavík. í Bjarnarins yfir Skaptártúngur og Landeyar. Hér er óreifnad ruggid og ljósvillan, sjá Stjörnufræðina bls. 151. Ad geta séð þessar stjörnur er nokkud vandgæft, þar þær eru mjög smáar. Enn til að finna, nær þær eru í hvirfilstíð, má hafa það til leidarvísis, að frammfótaklærnar Tóta og Kappa verða í hágaungu, þegar stjörnutíminn er 8 stundir 48 mínútur, og 8 stundir 53 mínútur, enn þessar tvær stjörnur eru glöggvar vel, enn hinar óglöggvari háganga fyrir og síðar, eins og vorknútsfjærdirnar á Foeda. Efka má hafa það til leidarvísis, að Sjóstirnid er í fullu vestri, þegar stjörnutíminn er 8 stundir 49 mínútur á suðurlandi, enn 8 stundir 51' á miðju Íslandi, og 8 stundir 53' á norðurlandi, enn stjörnutíminn reiknast frá því augnabliki. er vorfnúturinn er í háfudri; sjá Stjörnufræðina bls. 149, 21, enn einkum 193.

2. Björn hinn minni.

Skáldin sögðu, að hinn minni Björn væri Arkas, sonur Kallistoar, dóttur Þýkaons frá Arkadíu; þennan Arkas stýrði Júppíster hafa sett á himininn í bjarnarmynd, eins og áður er sagt. Stjörnumerki þetta hefur nokkra líkingu við stóra Wagninn, og kallast því minni Wagninn. Sú merkilegasta stjarna þar stendur yst á halanum Bjarnarins, og heitir Rýnosúra

(Hundsrófa). Halinn lýsir sér einn og bogin stjörnuroð, og hefur það kannsté gefid tilefni til þessa nafns, eða að lifja henni við hundsrófu. Þessi stjarna er á vorum dögum sú næsta stóra stjarna við mündul jarðar vorrar, og kallast því pólstjarna (Stella polaris, mündulstjarna). Hún er (2), og má finna hana með því, að draga stefnu-línu í gegnum Beta og Alpha stóra Bjarnarinn, og halla henni á framm, þá ganga til þessi annarar stærðar stjarna verður fyrir auganu. Sé nú stóri Wagninn í nordri, þá á að draga þessa línu upp á við frá áður nefndum tveimur stjörnum, sem þá eru þær austustu af vagnstjörnunum. Línan, sem þannig skal dragast, verður álíka laung, sem stóri Wagninn sjálfur. Þar á móti, ef Wagninn er á sudur-lopti, þá á að draga þessa línu til norðurs frá sömu tveim stjörnum, sem þá eru hinar vestustu. Þegar nú Sjóstirnid er í landsudri eða dagmálaftad, þá standa í útnordri frá mündulstjörnunni tvær stjörnur á þridjungi vegar milli mündulstjörnunnar og Venet-nasch í stóra Birni, þó ekki öldungis á beinni stefnu. Þær heita Verdir, Wardmenn (Custodes). Sá stærri er (2), og sá minni (3). Þó að nú ekki standi so á tíðinni, að Sjóstirnid sé í land-sudri, þá má ætíð finna þá; því frá Sjóstirninu má ætíð draga línu til mündulstjörnunnar, og halda henni síðan beint á framm, þá verður fyrir auganu ætíð á sömu stefnu hinn minni Wördurinn. Aftur á mót, sjái maður ekki Sjóstirnid, heldur Wardmennina, þá má finna, hvar Sjóstirnid er, með því að draga línu frá minna Verdinum til mündul-

stjörnunnar, og halda so á frammi frá møndustjörnu-
 unni sjöttíng hrings, er þá komid ad Sjostirninu. Þó
 yrði það nákvæmara, ef maður brúkaði hér til
 møndulinn sjálfan, í stadian fyrir møndustjörnunna,
 þóf hún er ekki öldungis í møndlinum sjálfum, eins
 og bráðum mun sýnt verða. Renn geta þóf allt
 eins vel, og jafnvel betur, fundid, hvað frammordid er
 af minna Verdinum, enn af Sjostirninu. Sé Þordur-
 urinn nidur undan møndli, þá vanta ad eins 17
 mínútur, til ad Sjostirnid sé í hásubri eða í flukku-
 hádeigis stad. Sé vardmaðurinn austur og nidur
 frá møndli, er Sjostirnid nærfeldt í nónstadi eða
 einni eikt frá sinni hágaungu. Sé Þordurinn rétt
 austur undan møndli, þá eru tvær eiktir lidnar frá
 Sjostirnisins hágaungu. Sé Þordurinn sudur og
 upp undan møndli, þá eru 3 eiktir lidnar frá há-
 gaungu; sé Þordurinn rétt upp undan møndli, þá
 eru 4 eiktir lidnar. Sé Þordurinn vestur og upp
 undan møndli, þá 5; sé hann vestur undan møndli,
 þá 6 eiktir frá hágaungu; sé hann vestur og nidur,
 þá 7 frá hágaungu Sjostirnisins. Enn alstad-
 ar munar um þær ádur nefndu 17 mínútur. Nú
 er ad feigja frá helstu stjörnunum í minna Birni,
 og eru þær nefndar eptir stöfunum í grífla stafrofinu
 þannig: møndustjarnan aptast á rófunni heitir
 Alpha Bjarnarins; stærri Vardmaðurinn á herbar-
 bladi Bjarnarins (2) heitir Beta. Hún heitir
 líka á arabísku Kochab. Minni Vardmaðurinn
 á bógi Bjarnarins (3) heitir Gamma. Nu skipt-
 ist rófan í þrjá hluti: fyrsti þridjungurinn, mældur
 frá møndustjörnu, takmarkast af stjörnu (3),

sem heitir Delta; sá annar af stjörnu (4), er heitir Epsilon. Stjarna á lendinni (4) heitir Beta, og á lærinu (5) heitir Eta, og rétt ofan til við hana stjarna (5), er heitir Kappa. Þegar litli Þjörninn er fyrir vestan og ofan møndulinn, liggur hann á bakid, so fæturnir sáa upp. Þegar hann er fyrir vestan og nedan møndulinn, þá stendur hann á höfði. Þegar hann er fyrir austan og nedan møndulinn, stendur hann rétt á fótunum, og fer so að klifra upp á við, enn bakid geingur ætíð á undan, þegar hann snýst við veltu jarðar.

Þær helstu vorknúts- og miðbaugs-fjærdir í minna Birni, sem hér er verdt að seigja frá, eru:

	Vorknúts fjærd.			Miðbaugs- fjærd.		
Möndulstjörnu	1	stund	2' 4"	88°	29'	1"
Kochab . .	14	—	51' 13"	74°	47'	21"
Gamma . .	15	—	21' 0	72°	23'	8"

Af miðbaugsfjærd möndulstjörnunnar 88° 29', eða nærfelbt 88 $\frac{1}{2}$ °, má sjá, að nú um stundir er baugur sá, sem möndulstjarnan gjörir við jarðarveltuna, 3 gráður að þvermáli, enn hálfu þvermál hans 1 $\frac{1}{2}$ °, sem er möndulstjörnunnar fjærlægd, frá þeim sanna møndli, að óreiknudu ruggi möndulsins, sjá Stjörnufræðina bls. 151. Af þessu mundi fljóta, að norðrið, fundid af möndulstjörninni, gæti flakkað um 3° 33', ef ekki væri abgætt sú rétta tíð, á hvarri möndulstjarnan er rétt upp undan eða niður undan miðju hringis hennar. Sú tíð, á hvarri möndulstjarnan er upp undan møndli, er þegar Sjóstirnid er vart komid í landsubur, og vanti 19' á miðju Íslandi, 23' syðst,

15' norðast; enn hin tíðin, á hvarri hún er niður undan møndli, er, þegar Sjóstirnid geingur úr útnordri, 45' á midju Íslandi. Á þessum tímum ætti maður, til að finna norðrið, að heingja snúru með lóði á fyrir møndulstjörnuna, og sjá so, hvar yfir bæri á jörðinni eða sjóndeildarhringnum. Þó maður ekki viti landsudrið eða útnordrið nákvæmlega, þá gefur møndulstjarnan manni þó það norður, og þar af aptur það landsudur, sem ekki flakkar eptir ádursegðu meira enn um 3° 33'. Enn með því nýja landsudri getur maður af møndulstjörnunnni aptur fundið langtum nákvæmara norður, og þar af aptur langtum nákvæmara landsudur. Þíka má brúka aðra aðferð til að þekkja tíðina, nefnilega, að heingja snúrana fyrir møndulstjörnuna, þegar snúran getur undir einö geingid mitt ofan á milli stjarnanna Alíoth og Mizar í stóra Þagninum. Þessar reglur byggjast á núverandi vorlútsstjörbum møndulstjörnunnar, og hinna annara þar til brúklubu stjarna. Allar stjörnur hins minna Þjarnar eru møndulsvæðisstjörnur. Þær eru ætíð fyrir nordan hvirfil á Íslandi, og komast aldrei á sudurloft; þó vil eg undantaka eina stjörnu fimmtu stærðar, og fáeinar sjöttu stærðar, sem ná hvirfli á norðurlandi.

Jeg vil aptur til þess, er áður er sagt, að Sjóstirnid mætti ekki að fullu komast í landsudur, þegar mida flýði møndulstjörnuna. Þessu hagar þannig, að þegar stjarnan Alhóne (sú stærsta í Sjóstirninu) er í landsudri réttu, þá er hér á midju Íslandi, þar sem breiddin er 65°, stjörnultíminn 1 stund 21' 3", enn møndulstjörnunnar háganga verður,

Þá stjörnutíminn er 1 stund 2' 4"; mismunurinn hér á er 18' 59", eða nærfelbt 19', sem møndulstjarnan hágeingur fyrri, enn Alkyóne kemur í landsudnr. Nú breytist þessi mismunur eptir því, sem madur er sunnar eða norðar á Íslandi, so að við hvorja breiddarminútu eða tæpan fjórdúng milu, sem madur er sunnar; þá eykst munur þessi um 2½", so að á mílunni munar um 9", enn á gráðunni, sem er 15 mílur, munar það 135" eða 2' 15"; so að á 64° breiddargráðu, sem er tveim mílum sunnar enn Reykjavík, so sem í Reblavík, Reykjum í Ölvesi, Dlafsvöllum og Dvísferjum, verður munurinn 21' 14", sem Sjóstirnib skal vanta, til að komast í rétt landsudur, þegar mida skal møndulstjörnuna. Þar á móti á norðurlandi er munurinn eptir sömu reglu minni, so að á 66° breiddar, so sem sunnan til við Holt í Dnundarfirði, á Drkinni við Reykjarfjörð, á Ströndum, sunnan til við Málmei í Skagafirði, norðan til við Upða í Eyafirði, við Þaxarósi í Skjálfsandafirði, og sunnan Skeggjastadi við Sandvík, verður munurinn 16' 44", sem Alkyóne á að vanta, til að komast í landsudur. Í útnordrinu er munur þessi langtum minni. Á 65° breidd er Alkyóne í útnordri, þegar stjörnutíðin er 12 stundir 18' 2", enn møndulstjarnan er lægst, þegar stjörnutíðin er 13 stundir 2' 4", so þá er Alkyóne fyrir 44' 2" komin úr útsudri. Enn á hvorjum 20' breiddarinnar munar þar um 7" tíðarinnar; enn 20' breiddar er nærfelbt sama sem þingmannaleib, enn 3 þingmannaleibir eru nærfelbt í gráðunni, og á henni munar um 21", so að á 64° breiddar er Sjóstirnib fyrir 44' 23" komib

úr útnordri, sem þá gildir fyrir Reblavík, Kenfi, Dlafsvelli og Tvíflór. Þar á móti er Sjostirnid fyrir 43' 41' fomid úr útnordri, þar sem breiddin er 66°; eru þau héröð áður talin.

3. Kasíópea.

Þetta stjörnumerki á að tákna drottningu. Cepheusar kóngs í Eþíópíu (Blotlumannalandi), og eru madur hennar, dóttir Andrómeda og mágur Perseus líka sett meðal stjarnanna. Vegut yfir frá stóra Wagninum, yfir um møndulstjörnuna að höfða, stendur í vetrarbrautinni kráustigur af stjörnum, flestum þriðju stærðar, nærri því eins langt frá møndulstjörnunni, sem hún er langt frá stóra Wagninum. Kráustigur þessi hefur þrjá blifki eða apturhvarfspúnka, og er það Kasíópea. Til að ganga á róbina eptir kráustignum, og byrja á vesturendanum, þegar Kasíópea er í hálopti eða sudurlopti, þá heita stærstu stjörnurnar Beta, Alpha, Gamma, Delta og Epsílon. Beta í Kasíópeu stendur á mótis við Delta í stóra Wagni, Alpha í Kasíópeu, með arabísku nafni Schedir, nærfeldt á mótis við Epsílon í stóra Wagni eða Alíoth, en Gamma í Kasíópeu stendur þó beiuna móti henni. Delta í Kasíópeu á mótis við Mizar, og Epsílon Kasíópeu mótis við Venetnasch, þegar allt af er línan dreigin í gegnum møndulstjörnuna, er stendur á miðjum veigi. Þessar tölðu stjörnur í Kasíópeu eru þriðju stærðar, nokkud minni enn stjörnurnar í stóra Wagninum. Þær þrjár fyrstu stjörnurnar, Beta, Schedir og Gamma, myndu nærfeldt jafnhlida þríhyrning,

hvar af Beta er vestast, enn Schedir syðst, þegar Kassíópea er í hálopti. Milli Schedir og Gamma á þriðjungi vegar er stjarna (4), sem heitir Eta, og fyrir sunnan Schedir, þó lítið vestar, önnur (4), sem heitir Zeta. Þær eru nær því í beinni röð, Gamma, Eta, Schedir og Zeta. Dragi mætur línu frá Delta til Epsilon, og haldi henni so á frammi álíka langt frá Epsilon, sem Epsilon er frá Delta, þá kemur mætur til stjörnu (4), sem heitir Zóta. Stjarnan Zeta er á höfði Kassíópeu, Beta undir hægra handtríka á stólnum; Alpha eða Schedir og líka Eta á brjósti; Gamma á hægri mjödm, Delta á kné, Epsilon á höfslungi, Zóta nedan il. Kassíópea situr á stóli, enn stólinn og hún liggja á hliðinni vinstri, og þegar himininn snýst við jarðarinnar veltu, þá geingur höfudid ætíð, eða fá upprétti hægri handleggur, á undan; Beta er því vestast, þegar Kassíópea er í hálopti, enn austast, þegar hún er í nordri. Vorknúts- og midbaugsstjærdir eru þessar:

	Vorknúts- stjærdir		Árs- færsla.	Midbaugs- stjærdir		Árs- færsla.
Beta (Chaph)	0 st.	0' 52"	3"	58° 17' 49"	+ 20"	
Schedir	0 -	31' 43"	3"	55° 41' 15"	+ 20"	
Gamma	0 -	47' 22"	3"	59° 52' 36"	+ 19",6	
Delta	1 -	15' 40"	3", 7	59° 25' 33"	+ 19"	
Epsilon	1 -	43' 16"	4", 1	62° 54' 12"	+ 18",1	

A vorknútsstjærðinni má sjá, að Beta er á þessari öld nær því samferða vorknútnum gegnum hádeigisbauginn, þar árið 1845 að einö 52" eru lídnar, frá því vorknúturinn var í hágaungu. Enn talan 3", sem í þessari töflu standa þar fyrir aftan vor-

knútsfærðina, þýðir, að árlega vaxi vorknútsfærðin um 3 sekúndur tíðar, vegna frammfórnarinnar; sjá Stjornufræðina bls. 151 — 152. Af því nú stjarnan Beta í Kasíópeu munar sér árlega 3^u-austur á, þá sýtur þar af, að á 3 árum hér frá verða komnar 61 sekúndur, eða rúm ein mínúta; so að árið 1848 hágeingur Beta einni mínútu seinna, enn vorknúturinn. Með lífum hætti þýða litlu tölurnar í seinasta dálki, að stjarnan breyti árlega finni midbaugsfærð til norðurs eða aukningar, þegar þar stendur framan við +, enn til suðurs eða minunar, þegar — stendur þar framan við. Enn hér teljast ekki tíðarsekúndur, heldur bogasekúndur. Af midbaugsfærðunum í þessu töbluforni má sjá, að þegar Kasíópea er í hálopti, þá standa þriðju stærðar stjornurnar þannig, að Beta er vestast, Schedir landsudur frá henni á suðurodda; Gamma landnordur frá Schedir á norðurodda; Delta í austurlandsudri frá Gamma á suðurodda; og Epsilon í landnordri frá Delta á austurenda kráustígsins, sem stærstu stjornurnar mynda; þó leingist þessi seinasti leggur kráustígsins af einni nokkud minni stjornur (4), Zóta, sem landnordast stendur. Fleiri stjornur fjórðu stærðar vil jeg nú telja, auk þeirra áður nefndu Beta og Eta. Þá er norður frá Schedir, enn lítið eitt vestar, stjarna fjórðu stærðar, sem heitir Kappa, er hágeingur 7 mínútum fyrir enn Schedir, eða þegar stjornutíðin er 0 stundir 24 mínútur. Utordan til við Köppu stóð nýja stjarnan mikla, er árið 1572 fást í Kasíópeu; samanber Stjornufræðina bls. 145. Í suðurútsudri frá Deltu stendur Þeta. Þessi stendur

á vinstra olboga Kasíópeu, og eru nú upptafdar allar þær stjörnur í Kasíópeu, sem ekki eru minni enu fjórðu stærðar. Allar þær upptöldu ganga yfir suðurloft á Íslandi, og ná ekki hvirfli þar. Þó eru margar smærri stjörnur í þessu merki, sem ganga yfir hvirfil á Íslandi, og jafnvel fyrir norðan það. Enn allar eru stjörnurnar í Kasíópeu møndulsvæðisstjörnur á Íslandi. Þær ganga alltaf hátt, þegar þær eru í norðri, einn og stóra Wagns stjörnurnar, þegar þær eru í norðri, hvað ed sjá má af miðbaugssjærbum þeirra.

4. Freindýrid.

Freindýrid byrjar nær því rétt við møndulstjörnuuna, þeim meigin, er frá snýr Berdinum stærri í minna Birni; það snýr apturhluta sínum að henni, enn höfðinu frá. Það nær so langt, að höfudid á því er einn langt frá møndulstjörnunni, sem møndulstjarnan er frá Berdinum. Freindýrid hefur aungvar stórar stjörnur, heldur að einn fimmtu og sjöttu stærðar stjörnur, og þaðan af minni. Bakid á því geingur á undan, þegar himininn snýst, enn fæturnir á eftir. Meira er ekki verdt að lýsa því hér; og eru í því allar stjörnurnar møndulsvæðisstjörnur, og ganga fyrir norðan hvirfil á Íslandi.

5. Vinvidargætirinn.

Á latínu kallast hann Custos messium. Stjörnufræðfugurinn Bode hefur gefid merkinu þetta nafn í minningu stjörnuþekingsins Messier, er uppgötvad hefur margar halastjörnur. Enn Messier þýðir varð-

mann vngarða. Þetta merki liggur mønduls meigin við Kasblópeu. Hofudid á Vinvidargætinum er mitt á milli møndulsstjörnuunnar og Betu í Kasblópeu, enn fæturnir eru flammt frá Tótu í Kasblópeu. Hofudid geingur á undan, þegar himininn snýst. Flestar stjornur Vinvidargætisins ganga fyrir norðan Ísland, enn fáeinar yfir Ísland. Allar stjornur í því merki eru smáar, og er því ekki verdt að seigja frá þeim meira.

6. C e p h e u s.

Cepheus stóldi hafa verið kóngur í Blokkumanna-landi, hans drottning var Kasblópea. Þetta stjornumerki er fyrir vestan Kasblópeu og Vinvidargætinn, og nær frá minna Birni til vetrarbrautarinnar. Með hægri fæti spyrnir hann aftan í lærid á minna Birninum, enn vinstra fótur hælinn hefur hann, þar sem mætist møndulsstjarnan og Hreindýrid. Frá því Sjóstirnidi er í norðurlandnordri, og til þess þad er nærri komid í sudur, er Cepheus að ganga í gegnum ofanverdan hádeigisbaug. Taki maður sér stefnu frá Schedir til Betu í Kasblópeu, og haldi henni beint á framm, so sem 4 sinnum so langt frá Betu, sem Beta er frá Schedir, þá er komid að stjornu þridju stærðar, sem heitir Alpha í Cepheusi, enn á arabísku Alderamin, stendur hún á hægri orl Cepheusar. Því næst myndi maður sér sirkilfót settan í Betu Kasblópeu, og hinn fótinn spenntan í Alderamin, og með þessum sirkilfæti í Alderamin sirklaban hringboga, sem hætti, þegar komid er milli Betu og møndulsstjornu, þá geingur sá hveifdi sirkilfótur fyrst í gegnum Alderamin, hvar byrjad var, so í gegnum stjornu þridju stærðar,

er heitir Beta Cepheusar, á belti hans, og seinast í gegnum stjörnu þriðju stærðar, er heitir Gamma Cepheusar, og er á vinstra kné hans. Þessi sama Gamma er nærri á beinni stefnu milli Betu í Kassíópeu og møndulstjörnunnar, og stendur á tveim þriðjungum vegar frá Betu. Beta á Cepheusar belti stendur líka nærfeldt beint á milli Alderamin og møndulstjörnu. Sudur undan Cepheusar Betu, þó lítið austar, er kóróna Cepheusar, á hvarri að eru þrjár stjörnur fjórðu stærðar, nokkud þétt saman; heitir sú austasta Delta, sú syðsta Epsilon, og sú vestasta Zeta; þær mynda dálítinn þrihyrnng, og standa í vetrarbrautinni. Hér er ráð fyrir gjort, að Cepheus sé á hálopti. Sé þar á móti Cepheus fyrir neðan møndul, þá verður kórónan fyrir norðan Betu, og dálitid vestar; Delta er þá vestan á kórónunni, norðast Epsilon, og austast Zeta. Sé stefnunni frá Betu í Kassíópeu til Alderamin dálitid leingra á framm haldbid, á líka langt og er á milli Schedir og Betu í Kassíópeu, þá er komid að stjörnu fjórðu stærðar, er heitir Eta, og er hún á hægri handleggis olbogabót Cepheusar, enn nálægt midri stefnu þessari frá Betu til Alderamin, þó nær møndulstjörnu, er á vinstri handleggi stjarna fjórðu stærðar, sem heitir Zóta. Þessi er sú eina eptirtakanlega stjarna í Cepheusi, er geingur yfir Ísland.

Þorknúts = og miðbaugsfjærdir tel jeg þessar:

	Vorknúts: sjærd.	Árs: færsla	Midbaugs: sjærd.	Árs: færsla.
Alberamin	21 st. 16' 15"	3",3	61° 55' 43"	15"
Beta	21 - 26' 37"	0",8	69° 52' 50"	15",7
Þóta	22 - 44' 10"	2",1	65° 23' 13"	18",9
Gamma (Errai)	23 - 33' 2"	2",3	76° 45' 54"	19",9

Áf midbaugsfjærdinni má sjá, að Þóta í Cepheus geingur yfir Ísland fyrst í Lodmundarfirði, so Eyðahínghá í Fljótsdalshérad, so yfir midjan Tokuldal, so yfir Fjöll, so yfir Bárðardal, Hólasókn í Eyrafirði, so Mælsfellsókn í Skagafirði, Svartárdal, Blöndudal, Mælstab, Prestsbakka og Saurbæinn með Skarðsströndinni við Breiddafjörð. Þegar himininn snýst við veltu jarðar, þá geingur hægrí hlið Cepheusar á undan, og höfud hans snýr æfílega frá mündli, enn fæturnir að. Allar stjörnur í Cepheus eru mündulsvæðisstjörnur. Þær stjörnur í Cepheus, sem lægst ganga, eru Lóróna hans, og geingur hún álíka hátt í nordri, eins og sólin í háfudri, þann 5ta apríl og 8da september.

7. Nordurdrekinn.

Á latínu heitir hann *Draco*. Þetta merki á að teikna dreka þann, er stjöldi vera afvæmi Forskysar og Gefóar, hann varðveitti gulleplin í Hesperidanna aldingardi, og var drepinn af Herkúlesi. Hann vefur sig í bugdum í fríngum nordurmöndul sólbrautar, og hali hans nær á milli meira og minna Bjarnar. Mitt á milli minna Barbaríns í minna Birni og Mizar (midstjörnunnar á hala meira Bjarnaríns) stendur stjarna þridju eða fjórdu stærðar, sem heitir Alpha í Drekanum. Á Arabísku heitir hún

Thuban. Hún er af því einkar merkileg, að hún fyrir 46 öldum síðan, eða fyrir 4600 árum-síðan, var mörðulsstjarna, það er að skilja: hún var þá hin næsta mörðlinum. Þetta er annars eldra enn so, að menn hási sögur af; enn er ályktad af reglu frammsfórnarinnar, samanber Stjörnufræðina bls. 152. Með sama hætti má finna, að eptir 24 aldir hér frá verði Gamma Cepheusar mörðulsstjarna. Taki maður sér beina stefnu frá Drekan's Alpha til Bláskjörunnar, þá hittir maður á tveim þridjungum þess vegar tvær hjartar stjörnur annarar stærðar, sem heita Beta (M-vaid) og Gamma Drekan's, Beta sú, sem nær er Benetnasch í stóra Birni, enn Gamma hin fjærlægari. Þessi Gamma heitir á arabísku Etanin. Í nánd við þessar stjörnur mörðuls meigin eru tvær aðrar minni, þó miðstórar; sú stærri er þridju stærðar, og heitir Xi Drekan's, nálægt stefnunni frá Etanin til mörðuls; hin önnur er fjórðu stærðar, og heitir Ni Drekan's. Þessar fjórar stjörnur, Beta, Gamma, Xi og Ni, mynda flakkferhyrning sína á milli, og eru á höfði Drekan's, Etanin milli eyrna á kalli, Beta á auganu, Ni á munnvíki, og Xi á kjálkabardi. Ni stendur að mestu beint á milli Beta og mörðuls. Í nánd við þessar 4 stjörnur er hin fimmta, á stefnunni frá Beta Drekan's til Mizar í stóra Birni, hún heitir Ni, er 4du stærðar, og stendur fremst á vörum Drekan's. Stjarnan Ni er tvístjarna, ellegar kannstke tvær stjörnur, hvor fyrir sig 5tu stærðar. Menngeta og með öðrum hætti fundid höfudid á Drekanum, nefnilega með því, að draga beina línu frá Gamma í Kassíópeu gegnum Beta á beltí Cepheusar, og halda

henni á framm rúmlega annann einn veg þadan, þá er komid ad Beta og Gamma, stærstu stjornunum á höfði Drekanö. Rétt vid höfudid á sér setur Drekinn á sig lykku hina fyrstu. Hún er manni ætíð til vinstri handar vid höfud Drekanö, og eru á henni margar smáar stjornur. Ein er þar, sem tekur hinum öðrum framm, er 4du stærðar, og heitir Omikron Drekanö; hún er nærri á beinni línu vid M η , M θ og Xi, og álfa langt frá Xi, sem Xi er frá M η . Á milli hennar og Xi er Drekanö fyrsta lykku. Þessi Omikron er tvíljarna. Hin önnur lykku Drekanö liggur yfir undir hægri hlið Cepheusar; eða, ef vill, má finna hana þannig, ad frá Kasstöpeu ad reikna, þá liggur önnur lykku Drekanö tvo þridjunga vegar til drekahöfudsins á beinni stefnu. Ein af þeim stjornum, sem á lykkuinni standa, er Ró; hún stendur þannig, ad nærfeldt jafnhliða þrihyrningur verður milli Alderamin, Beta í Cepheus og hennar, og stendur Ró á þeim odda þrihyrningsins, er frá snýr Kasstöpeu. Ró er stjarna 4du. eða 5tu stærðar. Nokkud leingra frá Alderamin og Beta Cepheusar, þak vid Ró í Drekanum, stendur stærri stjarna 3ju stærðar, sem heitir Delta; er hún sú stærsta af stjornunum á annari dreka lykkuinni. Skammt frá henni, þeim meigin, sem frá snýr mündli, er stjarna 4du stærðar, sem heitir Pi. Sú er líka í beinni stefnu vid Beta Cepheusar og Ró Drekanö. Enn á hina síðna vid Delta Drekanö, á stefnunni þadan til Gamma Cepheusar, er stjarna 4du stærðar, er heitir Sigma. Hún er líka í beinni stefnu vid Alderamin í Cepheusi og Ró í Dreka. Þessar fjórar stjornur, Delta, Pi, Ró og

Sigma, standa allar á annari lykkjunni, og mynda þar dálitinn skakkerhyrning. Hin þriðja lykkja Drekans liggur nærri yfir undir fótunum á minna Birni. Nærri miðs vegar milli Etanin á drekahöfði, og Kochab í minna Birni eða stærra Bardmannsins, er stjarna þriðju stærðar, er heitir Zeta. Aftur nærri miðs vegar milli hennar og minna Bardmannsins er stjarna 4du eða 5tu stærðar, sem heitir stóra A Drekans. Þessar stjornur eru stærstar á þriðju lykkjunni. Nú eru ekki lykkjurnar fleiri. Enn frá þortunum búksins, sem á millum lykkjanna eru, þarf þessu næst nokkud að skýra. Á partinum milli fyrstu og annarar lykkjunnar eru að eins smáar stjornur, sem ekki er verðt frá að skýra. Enn á partinum milli annarar og þriðju lykkjunnar eru þrjár stjornur 4du stærðar, er heita Tá, Chí og Omega, og er nærri jafn langt á milli þeirra; þær mynda dálitinn boga, sirklaban um Omikron, og Omega stendur rétt við þriðju lykkjuna, á beinni stefnu frá lærhnutu og læri minna Bjarnarins. Þún er líka á beinni stefnu og rétt miðs vegar milli minna Bjarnarins og Omikron Drekans. Þegar aftur fyrir þriðju lykkjuna kemur, þá byrjar halinn; eru þá fyrst þrjár stjornur, Eta, Peta og Tóta, allar 3ju stærðar; þær mynda boga þannig, að ef menn ímynda sér sirkilsfót settan í minna Bardmanninn, og hinn í Etu, þá getur þessi sirkilsfótur í Etu líka geingid í gegnum Peta og Tótu, þó er Tóta, og einum Peta, lítið eitt fjær. Eta er nærri í beinni línu við báða Bardmennina, og hér um bil helmingi nær minna Verdinum, enn auga Drekans er, og er á þeirri stefnu beint undan Bardmannunum eingin önnur

stjarna 3ju stærðar til villu. Tóta er á beinni stefnu frá møndulstjörnu og minna Verði, og að fjærlægd, sem áður nefndur bogi ákvarðar. Þeta stendur á þeim boga allka langt frá Etu og Tótu. Nú beygist dreka-
 halinn við, og liggur úr þessu lángs með stóra Wagninum, nærfeldt mitt á milli hans og Wadmanna; kemur þá eingin markverð stjarna, fyrr enn Alpha Drekan, sem áður er umtölub. Þar næst koma á hals-
 anum í sömu stefnu fyrst Kappa Drekan, og síðan Lambda, báðar 3ju stærðar. Lambda stendur nærri því á stefnunni milli Dubhe (í stóra Birni) og møndulstjörnunnar, á fjórdungi vegar frá Dubhe. Kappa stendur á beinni stefnu milli Dubhe og minna Wardar, og mitt þar á milli. Þó að þessi lýsing Drekan, kunnir sýnast hér nokkud flókin, þá verður samt ekki mjög órdugt eptir henni, að þekkja Drekan á himninum; því bæði er höfund hans auðþekktanlegt af þeim tveimur stóru stjörnum, Etanin og Betu, snýr það trjónunni, My, fram hjá endanum á stóra Wagninum, allka langt frá Benetnasch, sem Benetnasch er frá Mizar. Að öðru leiti adgreinir Drekin sig frá öðrum stjörnum eins og injór ormur, er beygir sig utan um miana Björninn, og er stjörnu-
 roðin víðast hvar einsett, nema á sjálfum lykkjunum. Þegar lykkjurnar reiknast ekki, þá líkist hann tölustafnum 5 í síffrutölu; verður þá minni Björninn í stærtra vikinu, enn nordurmöndull sólbrautar í hinu minna. Þessi sólbrautaröndull er næsta athuga-
 verður; því kríngum hann ganga allar fyrðarsjörnur sinn framsóknargang, og nálgast hann hvorki né fjærlægjast á þeim kríng, enn sjálfur framsókn-

orhringurinn virðist geta fullendast hér um bil á 25,765 árum. Bugge reiknar þá tíð 25,740 ár, enn Schubert 25,790 ár. Mennt geta því fundið veg þann, er sérhver stjarna þekkt frammi eptir framfórninni, með því að setja þann eina sirkilfótinn í sólbrautararmöndulinn, enn hinn annann í stjörnuna, og láta þennan sirkla boga sinn til austurs. Með lífum hætti getur maður, með því að hafa nákvæmlega ákvarðað stað sólbrautararmöndulsins, ákvarðað legu sólbrautarinnar sjálfrar, með því að snúa rétt horns máti (réttum vinkl) þannig í kring, að sá eini kjálki inn allt af horfi á sólbrautararmöndulinn, því þá bendir hinn kjálki allt af á sólbraut, meðan honum er snúid hrínginn í kring. Í sólbrautararmöndli mætast allir breiddarhríngar, á hvorjum breiddirnar mælast frá sólbraut og til sólbrautararmöndul, líft einn og miðbaugsfjærdirnar mælast á miðbaugsfjærdahringunum frá miðbaug til miðbaugsmöndul, sem kallast jarðarmöndull. Enn nú er eptir að miða niður sólbrautararmöndulinn. Hann er á beinni stefnu milli Omega og Omikron Drekan, og er fjórða part þess vegar frá Omega. Hann er líka á beinni stefnu milli Beta og Gamma Drekan. Af sturðarpunkti þessara tveggja stefnulina má því finna sólbrautararmöndulinn. Þar á móti er suður-sólbrautararmöndullinn nálægt auga Sverðfiskjarins, hvar í nánd er stjarnan Epsilon Sverðfiskjarins, sem er 5tu stærðar. Sólbrautarinnar norðarmöndull geingur yfir jarðarhnöttinn á þessum tímum, þar sem breiddin er $66^{\circ} 32' 30''$, og er sá hríngur kallaður möndulhríngur (Circulus polaris). Hann siggur fyrir norðan Ísland, raunar yfir Grímsey og

það að réttu lagi, enn vegna geislabrotsins sýnist hann sunnar, og þess vegna sunnan til við Långanes, yfir Þórdarhöfða í Skagafirði, Reykjarsfjörð á Ströndum, og yfir Þyrassfjörð. Þar á við sjóarmál hálf sólin að vera yfir hafsbryn á sumarsólstádanóttum. Hann stendur líka ekki í stad, heldur smáferist norður eptir, so sem um 8 fadma árlega að miðlengi, enn Þjóttir samt langtum meira til og frá, slundum nærfeldt 170 fadma á báðar síður frá miðlengi. Þetta kemur af ruggi jarðarhnattarins, sjá Stjörnufræðina bls. 152. Ánnar hringur markverður liggur einnig gegnum sólbrautarmöndla, enn undir eins gegnum báða jarðmöndla, og það er sólhyvarfakubblingurinn (*Colurus solstitialis*); hann geingur í gegnum báða sólhyvarreitina. Taki maður stefnuna frá sólbrautarmöndli til jarðmönduls, og haldi henni á framm, unð komnar eru 90° frá sólbrautarmöndli, þá er komid á sumarsólhyvarfastabinn, sem er byrjunin á Krabbamerki. Þar á móti, ef maður tekur sér stefnu frá sólbrautarmöndli í gagnstæða átt við jarðmöndul, og heldur henni þágang til komnar eru 90° frá sólbrautarmöndli, þá er komid á vetrarsólhyvarfastabinn, sem er byrjunin á Steingeitámerki. Í gegnum jarðmöndul, enn ekki sólbrautarmöndul, geingur annar kubbhringur gegnum jafndægrareitina, og heitir því jafndægrakubbhringur (*Colurus æqvinoctialis*). Þeir reitir eru vorknúturinn og haustknúturinn, sem eru upphösin á Grúts- og Metafláa-merki. Nú er eptir, að setja hér vorknúts- og miðbaugsfjærðir nokkurra stjarna í Drekanum.

	Vorknúts: sjard.	Nrs: færsla.	Midbaugs: sjard.	Nrs: færsla.
Alpha (Thuban)	14 ft. 0' 11"	1 ^u ,5	65° 7' 3"	— 17"
Beta (Alvaid)	17 - 26' 55"	1 ^u ,3	52° 25' 7"	— 3"
Gamma (Etamin)	17 - 53' 0"	1 ^u ,4	51° 30' 32"	— 0 ^u ,7
Peta (Albib)	15 - 59' 1"	1 ^u ,1	58° 58' 38"	— 10"
Zeta .	17 - 8' 20"	0 ^u ,1	65° 54' 21"	— 4 ^u ,5
Delta .	19 - 12' 30"	0 ^u	67° 23' 9"	+ 6 ^u ,3
Pi .	19 - 19' 51"	0 ^u ,3	65° 24' 57"	+ 6 ^u ,8

Af þessum vorknútsfjærdum sést, að þessar stjornur háganga, þegar Blástjarnan er í austri landsudri, sudri og sudurútsudri, og þegar Sjóstirnid er í nordurúts-nordri, nordri, landnordri og austurlandnordri. Enn af midbaugsfjærdunum sést, að Beta, Gamma og Peta háganga fyrir sunnan hvirfil á Íslandi, að Alpha, Zeta og Pi ganga yfir Ísland, og að Delta hágeingur fyrir nordan Ísland. Að þær eru mوندuls-
svæðisstjornur, sést af því, að midbaugsfjærdir þeirra eru stærri, enn midbaugs hæðirnar á Íslandi, sem eru 26° 31' fyrir Vestmannaeyjar, og 23° 27' fyrir Grímsey nordan land. Þegar himininn snýst við veltu jarðar, þá geingur hali Drekans á undan, enn midlykkjan á eptir, og setur hann höfuðid undir sig. Þær lægstu stjornur í Dreknum ganga hátt í nordri, sem sólin í sudri á jafndægrunum.

8. Andrómeda.

Andrómeda Cepheusdóttir hlaut, eptir skádbanna

ímyndun, að gjalda þess, að móðir hennar Kassiópea hafði dirfst að feigja sig vera frðbani, enn Júnó. Til þessdard beiddi Júnó Neptún, að láta sjóskrimfli gánga á land, og gjöra tjón, unð Andrómeda, uppsvelgd af skrimslinu, bætti fyrir móður sinnar dirfsku. Hún var því bundin á höndunum við klett með járnavidjum, og eptir henni er stjörnumerkið kallað Andrómeda. Hún er á himninum fyrir sunnan móður sína Kassiópeu. Sé dreiginn lína frá möndulstjörnu til Betu í Kassiópeu, og henni á framni haldbil annann einð veg, er komið að stjörnu annarar stærðar á vinstra eyra Andrómedu, er heitir Alpha Andrómedu, enn á arabísku Sirrah. Sumir telja hana fyrstu stærðar. Hún er tvístjarna. Dnnur lína frá möndulstjörnu, gegnum Epsilon á fæti Kassiópeu, vísar á stjörnu (3) eða (4), er heitir Gamma Andrómedu. Nærri mitt á milli Sirrah og Alamað er stjarna (2), er heitir Beta Andrómedu, á arabísku Mirach, á belti Andrómedu. Dfan til við Mirach á beltinu er fyrst Mý Andrómedu (3), so Mý (4). Helst er það hér um bil í austurátt, að þessar stjörnur eru upp undan Mirach. Hægra meigin við Mý, og vel helmingi nær henni, heldur enn hin stjarnan Mý, er sú merkilega stjörnuþoka, sem talad er um í Stjörnufræðinni bls. 155. Fyrir beru auga litur hún út sem einstof stjarna, enn í sjóupípu einð og dálitill glampi eða bjarmi. Menn kalla hana (latínka) η Andrómedu. Nærri mitt á milli Sirra og Mirach eru þrjár stjörnur, sú efsta á hægra brjósti (4) heitir ρ , sú í miðid á vinstra brjósti (3) heitir Delta, og sú nedsta á vinstri øxl (4) Epsilon. Fyrir neðan þessar þrjár stjörnur, er standa

nærri því í rób, standa tvær stjörnur þvert við þeim á vinstra handlegg, Eta á olboga (4), og Zeta í olbogabót (4). Þær gjöra nærfelbt beina línu, Eta, Zeta og Cirrah. A hægra upphandlegg er einkum ein stjarna merkileg, sem heitir Peta (4); hún er einöf langt fyrir ofan brjóstin, einöf og Zeta og Eta eru fyrir nedan þau. Peta er líka á beinni stefnu og þridjúngi vegar milli Cirrah og Schedir. Nærri mitt á milli Schedir og Alamað er stjarna (4), á hægra fótur rist Andrómedu, er heitir Phi Andrómedu, eða Phi Perseusar, því sumir eigna hana Perseusi. Það er til hennar bein stefna gegnum Beta og Alpha Kasstöpeu. A midri leid milli Cirrah og kórónu Cepheusar eru þrjár stjörnur fjórdu stærðar, er, frá Cirrah að reikna, helta Góta, Kappa og Lambda. Sumir láta þær vera á Andrómedu hægri hönd. Einn stjörnuspékingur Bode telur þær vera í Fridriksheidri, enn lætur Andrómedu hægri hönd vera á beinni stefnu frá Cirrah til Beta í Kasstöpeu, hvar stærst er stjarna fimmtu stærðar, er heitir (stóra latínka) B Andrómedu. Mitt á milli Ny og Phi er stjarna (4), á hægra kálfa Andrómedu, er heitir Xi Andrómedu.

	Vorknúts: fjærd.	Árs: færsla.	Midbaug: fjærd.	Árs: færsla.
Alpha (Cirrah)	0 st. 0' 23"	3",1	28° 6' 15"	20"
n Andrómedu	0 - 34' 9"	3",2	40° 25' 54"	20"
Beta (Mirach)	1 - 1' 3"	3",3	34° 47' 54"	19"
Gamma (Alamað)	1 - 54' 24"	3",6	41° 34' 58"	17",6

Af vorknútsfjærdinni má sjá, að Alpha Andrómedu

hágeingur á þessari öld, þegar vorfnátturinn gjörir það. Andrómeda er einkum þekktanleg af þeim þremur nærri jafn stóru stjörnum, Alpha, Beta og Gamma, er liggja að mestu í beinni röð, og nærri jafn langt á milli. Andrómeda liggur ætíð, frá Íslandi að sjá, á sína vinstri hlið; höfudid er manni ætíð til hægri handar, eun fæturnir til vinstri, í hvorri átt sem hún er, so leingi sem maður snýr sér í þá sömu átt. Aldrei geingur hún yfir hvirfil; þó geingur hún í sudri talsverdt hærra, enn sólin, á sumarsólstöðum. Heunar stjörnur allar eru líka mوندulsvæðisstjörnur, nema vinstri handleggurinn, því hann geingur undir í nordri, af því hún réttir hann niður fyrir sig, þar sem höndin á að vera bundin við steininn. Þær áður nefndu stjörnur, Zeta og Eta, á olbogabót og olboga, ganga einö hátt og sólin, sú fyrri viku fyrir og eftir sumarsólstöðurnar, enn sú síðari þann 3ja júní og 10ða júlí.

9. Perseus og Medúsuhöfudid.

Riddarinn Perseus var sonur Júpíters og Danae. Hann frelsaði Andrómedu, með því að drepa skrimslid, þegar það ætlaði að gleypta hana. Þetta gladdi foreldra hennar, og gáfu þau hana Perseusi fyrir eiginkvinnu. Medúsa var í fyrstu fögur mey, er Neptúnus elskaði; enn Pallas reiddist þeim fyrir vanhælgun höfs síns, og umbreytti hárinu á höfði Medúsu í höggorma, og hvor, sem leit höfud hennar, varð að steini. Perseus var útbúinn með ægishjálm Minervu, hjó af henni höfudid sof-

andi, enn snéri andliti sínu frá á meðan, og notaði síðan höfudid, til að gjöra þá að steini, er hann vilði úr veigi hrinda.

A himinsæði því, er liggur frá Sjóstirninu upp til Kasíópeu, liggur bogi eða rósti af stjörnum, er taka öðrum fram á þeim stad. Þetta er Perseus; enn Medúshöfudid liggur í íhvölfu þessa boga, skammt á eptir Alamað í Andrómedu. Sé lína dreigin frá Sjóstirninu upp til Delta í Kasíópeu, þá á midri þeirri stefnu, eða réttara sagt, á Υ portum hennar frá Sjóstirninu, er höfud Medúsu. Þar eru 5 stjörnur saman í þyrpingu, hvor ein stjarnan er lóng stærst, og heitir sú Algol á arabísku, enn annars er hún köllud Beta Perseusar; þó er hún á Medúshöfudinu. Hún er ein af breytanlegu stjörnum; stundum er hún (2), stundum (4), ein og seigir í Stjörnufræðinni, bls. 144. Sé dreigin lína frá Mirach til Alamað í Andrómedu, og henni á frammi haldbid vel so annann einn veg frá Alamað, þá er komid til Alpha Perseusar (2), sem á arabísku kallast Algenib eða Mirfal; hún er á hægri hlið Perseusar. A leið þadan til Epsilon Kasíópeu er fyrst Gamma Perseusar, á hægri öxl, (3), so Eta Perseusar, í hægri handlegg: olbogabót, (4), og síðan á stefnu þadan, mitt á milli Eta Perseusar og Delta Kasíópeu, er stjörnuþyrping, sem nefnd er í Stjörnufræðinni, bls. 154; hún heitir Chi Perseusar, og er hún á sverdhjöltum hans. Frá Algenib, og niður að Sjóstirninu, eru fjórar stjörnur hinar merkilegustu, nefnilega: Delta (3), er stendur vinstri meigin við rostarbogann, sem áður er umgetid, að stjörnurnar í Perseus

myndi; þar næst Gamma (4), heldur hægra meigin, Epsilon (3), tví stjarna, heldur vinstra meigin, Beta (3), tví stjarna, heldur vinstra meigin. A hlið við Betu hægra meigin er Delta (4), tví stjarna; enn á midri leið frá Algenib til Sjóstirniskins er áður umgetin Epsilon á vinstra kné; Gamma er á midju vinstra læri, Beta er á mjóalegg. Vinstra meigin við rastarbogann er Lambda (4), á hægra kné út undan Algenib; og á flá niður undan henni er My (4), á hægri knésbót, tví stjarna, er nærfeldt út undan Delta. A Medúshöfði eru neðan til við Algol þrjár stjornur fjórðu stærðar, Þí efst, Ró vinstra meigin neðar, og litla latínfla p hægra meigin. Hægra meigin við Algenib er Tóta (4), og tvöfalbt leingra frá er Peta (4), á vinstri øxl, og er hún tví stjarna. Hún gjörir nærfeldt jafnhliða þríhyrning með Algenib og Gamma.

	Worknits: sjærd.	Aré: færsla.	Midbaugs: sjærd.	Aré: færsla.
Alpha (Mirfa)	3 st. 13' 16"	4",2	49° 18' 18"	13",4
Beta (Algol)	2 - 58' 5"	3",8	40° 21' 16"	14",2

Við dagsvæltuna geingur vinstri hlið Þerséusar á undan; hann hallast allt af á vinstri hlið sína. Hann liggur allur í vetrarbrautinni, nema vinstri fótur hans og Medúshöfubid. Allar stjornur í þessu merki eru hjá osk mæðulsöxðisstjornur.

10. Þríhyrningarnir.

Þeir eru tveir, sá stærri og minni. Sá stærri er sagt, að eigi að merkja Sikiley, því hún er þrí-

hyrnd, og skylði Júppter hafa sett hana þarna á himininn. Sá minni þrihyrningurinn er af stjörnuspekingnum Zevel settur á himininn.

Fyrr neðan Alamað eru þrjár stjörnur fjórðu stærðar, þær eru á stærri Þrihyrningnum. Tvær af þeim eru sér, Beta sú hægri, Gamma sú vinstri, enn leingra niður vinstra meigin er Alpha. Hinar stjörnurarnar í Þrihyrningunum eru mjög smáar. Þær ganga aldrei undir hjá oss.

II. Okumadurinn.

Á latínu heitir hann Auriga, og er það sama sem vagnmadur. Hann heitir líka Erichthonius, eptir kóngi einum í Athenuborg, er skal hafa innfært það, að aka í vagni. Hann heldur á geit, og er sagt, að það sé geitin Amalthea, á hvurrar mjólk Júppter lifði, þá hann var barn. Okumadurinn geingur á eptir Perseusi, og er auðþekktur af einni stórrí stjörnu fyrstu stærðar, sem heitir Alpha Okumannsins, eða Capella (geit, kildingur); sumir Íslendingar kalla hana Kaupamannastjörnu. Á arabísku er hún kölluð Alhajoðh. Þessi Kaupamannastjarna geingur hér um hálfri annari stund á eptir Sjóstirninu, enn geingur langtum hærra enn það. Þegar Bláskjarnan er rétt í útsudri, þá er Kaupamannastjarnan tæplega í landnordri, og er hún þá nærri 30° hátt. Skammt á eptir heani geingur minni stjarna lítið neðar, heitir sú Beta Okumannsins, á arabísku Menkalinan; hún er annarar stærðar, og stendur á hægri øxl Okumanns. Upp yfir Beta er Delta Okumanns (4), á kalli hans, lítið leingra frá Beta, enn Beta er frá Alpha. Neð-

an undir Kaupamannastjörnu, lítid til hægri handar, er lítill þríhyrningur af þremur stjörnum fjórðu stærðar, hvor af sú efsta heitir Epsilon, sú nedri til hægri Zeta, og sú nedri til vinstri Eta. Þessar þrjár, ásamt Kaupamannastjörnunní, eru á Beitinni. Fyrir nedan Beta, nærri á beinni stefnu við Delta og Beta, er Peta (4); stendur Beta nærri mitt á milli þeirra. Peta er á hægri útslid Mlumannss. Lina, í gegnum Capellu og Peta frammhaldin, hittir að mestu á Koppa, þannig að Peta verður á rúmri hálfri leid, enn á lokum $\frac{2}{3}$ vegar þar á milli, eða mjög nálægt $\frac{7}{12}$ vegar þar á milli. Nidur undan Alpha (Capella), þremur sinnum leingra enn er frá Alpha til Beta, þá er á landamærum Mlumannssins stjarna (2), er heitir Gamma Mlumannssins, ellegar Beta í Uranum, því stjörnufróðir eigna hana báðum merkjunum; er hún so bæði á hægri fótar rist Mlumannssins, og lífa á vinstra horni Uranss, leingst út á enda þess.

	Borknúts: fjard.	Arís: færsla	Midbaug: fjard.	Arís: færsla.
Alpha (Capella)	5 st. 5' 14"	4",4	45° 48' 12"	4",4
Beta (Menkalian)	5 - 48' 9"	4",3	44° 45' 29"	1",2

Ad allar stjörnur í Mlumanninum séu hjá oss mوند-
ulsvæðisstjörnur, einss og í Perseus, sem geingur á
undan honum, er auðskilid, þar báðir standa og
ganga einss hátt.

12. Kamelpardus.

Kamelpardus er eitt af þeim nýrri stjörnumerkj-

um; það er stórt um sig, og nær frá Skumanninum til møndulstjörnunnar eda minna Bjarnarins. Það gælingur á eptir Vínvidargætinum, og undan stóra Birninum, snyr lendinni að Vínvidargætinum, bríngunni að stóra Birni, og höfðinu að minna Birni. Þar eru í því að einn stjörnur fjórðu stærðar, og þaðan af minni.

13. Tigrisdýrid.

Það er líka eitt af þeim yngri stjörnumerkjum. Þúkur þess nær frá Skumannsins höfði til stóra Bjarnar. Frammfætur þess eru við hægri öxl Skumannsins, afturfæturnir eru ofan til við Krabbans norðurkló, hali þess snyr að minna Ljóni, lendarnar að frammlóm Lóta og Kappa stóra Bjarnar, og höfðinu að frammfótunum á Kamelparðusi. Í því eru einasta smáar stjörnur.

14. Ljón hid minna.

Það er eitt af þeim yngri merkjum, og liggur á milli stærra Ljóns og stærra Bjarnar. Það er þekktanlegt af fjórum stjörnum, er mynda dálktinn ójafnhlida ferhyrning. Eru þær allar á búi Ljónsins. Sé dreigin lína gegnum Delta, Gamma og Psi stærra Bjarnar, þá hittir hún frammeingd einn langt frá Psi, sem Psi er frá Delta, stjörnu, sem er þridju stærðar, og sem Kollud er (litla latínsta) í minna Ljónsins; er hún sú næsta vinstri hendi af umgetnum fjórum stjörnum, er mynda ferhyrninginn. A undan henni til hægri handar er stjarna (4), er heitir (litla latínsta) í minna Ljónsins. Enn nú lítið nær hægri

tendi, og lítid ofar, er stjarna (4), er heitir í minna Þjónsins, og loksins heitir sú efsta í ferhyrningum (litla latínsta) í minna Þjónsins, og er líka fjórdu stærðar; hún stendur upp undan h. Allar stjornur minna Þjónsins eru hjá oss møndulsvæðisstjornur, nema fáeinar á hala þess. Höfundur á Þjóni þessu geingur undan, þá himininn snýst.

15. Nautamalur og Mænalfjallid.

A grísku heitir Nautamalurinn Bodes, Nautreli; líka Arktophýlox, Bjarnargeymir. Þetta á að vera Þórus Dædalsson, hvers dóttir var Erígone. Mænalfjall heitir eptir fjalli í Arkadíu, á hvorju Mænall Þýkaonsson byggdi sér borg. Nautamalurinn er til vinstri handar við stóra Björninn, og er auðþekktur af stórrí raudleitri stjornu fyrstu stærðar, er heitir Arktúrus eða Alpha í Nautamanni. Sírkli madur boga í gegnum Delta, Epsilon og Eta í stóra Birni, og haldi þeim boga á framm til vinstri, um á líka lánan veg og Bogninn er lánur, þá er komid að Arktúrus. Hægra meigin við Arktúrus standa á vinstra fæti Eta (Muphrid), (3), Lá (4), og Epsilon (4), ofan eptir leggnum. Þar á móti vinstra meigin við Arktúrus eru á hægra fæti Nautamanns niður eptir leggnum Xi (4), Dmikron (4), Pi (3), og Beta (3), nærri í beinni línu. Lína, sem dreigin væri í gegnum Gamma og Eta í stóra Birni, hittir á Beta (3), á vinstra eyra Nautamanns; á arabísku heitir hún Nektar. Estrax nedan við Beta eru arljrnar, sín hvoru meigin, sú vinstri hans er hægra meigin vor, heitir Gamma (3); sú hægri hans er vinstra

meigin vor, er lægri og heitir Delta (3). A milli Arktúrs og Delta mitt er tof stjarna (3), heitir Epsilon, er á hægri mjödm, á arabísku Mirac eða Zjar. Epsilon, Delta, Beta og Gamma mynda flakkan ferhyrning. Fyrir ofan Delta, nærri á móts við Gamma, er Mý (4), á arabísku Alkalurops, á kylfunni, sem Nautamadurinn heldur á í vinstri hendi. A beinni línu við Alth og Mizar í stóra Birni stendur litill þríhyrningur, hvar í að eru þrjár stjörnur fjórðu stærðar, það er Nautamannsins vinstri hönd; heitir sú næsta við Mizar Koppa, sú neðsta Tóta, og sú, sem leingst er frá Mizar, Peta. Í þessari hendi heldur Nautamadurinn í tvö hönd, hvar í hann heldur báðum Weidihundunum. A vinstri alboganum milli Tóta og Gamma er Lambda (3). Nú er

	Þyrlnúts:	Ar:	Midbaugs:	Ar:
	fjærd.	færsta.	fjærd.	færsta.
Arktúrus	14 ft. 8' 35"	2",7	19° 59' 45"	18",9

Ular stjörnur Nautamannsins, sem eru fyrir ofan mitti hans, eru mænbulsoæðisstjörnur hjá ofs Íslendingum; hinar þar á móti, sem neðar eru, ganga undir hjá ofs. Arktúrus er einn af þeim, sem undir ganga, það er sjá má á midbaugsfærðinni. A midju Íslandi, þar sem breiddin er 65°, verður hans hálf dagbogi 9 stundir 34 mínútur hér um bil, það er að skilja sú hálf tíð milli hans upp- og niðurgöngu eptir stjörnutíma. Sé nú þessi tala dreigin frá hágaungutíma hennar, 14 ft. 9 mínútur, þá kemur uppgöngutími hennar, 4 ft. 35'. Sé hún þar á móti viðlögð, þá færst niðurgöngutíð Arktúrusar, sem er 23 ft. 43' stjörnutíðar. Arktúrus kemur

úr því upp, þegar Sjóstirnid er vart komid í sudurútsudur; enn nidur geingur hann nokkud fyrr, enn Sjóstirnid er í austurlandsudri. Það er því 4 stundir 52 mínútur, sem Arktúrus er nidri. Enn til að snúa þessum stjornutíma í sóltíma, þarf einkum að vita sólarinnar vorknútsþjærd, enn hún er á sífeldri breytingu.

Þæði það, að finna Sjóstirniskins, eða, ef vill, Blástjornunnar átt, á sérhverjum stjornutíma, hvort sem það er uppgöngu-, hágaungu- eða nidurgöngutími einhverrar stjörnu, so sem Arktúrusar, — og líka að finna sóltímann af stjornutímanum, er hægt með töblunum, sem í þessum leidarviki standa í lýsingu Hörpunnar. E. d. um átt Sjóstirniskins:

Uppkoma Arktúrusar 4 st. 35'

Sjóstirnid í sudri 3 - 38'

geingur af " - 57'

1 kompásstrik þar " - 34'

ganga af " - 23'

Sjóstirnid er því geingid 23' úr vesturhøllu sudri (Syd til Vest), ellegar, ef vill, $1\frac{3}{4}$ strikís úr sudri, enn vantar $\frac{1}{3}\frac{1}{4}$ úr kompásstrikli, eða 11', til að komast í sudurútsudur. $\frac{1}{3}\frac{1}{4}$ er nærri sama sem $\frac{1}{3}$, so að Sjóstirnid vantar þridjung strikís, til að vera komid í sudurútsudur, þegar Arktúrus geingur upp á hvarjum deigi.

Nidurganga Arktúrusar

eptir stjornutíma er 23 st. 43'

Sjóstirnid í austri 22 - 25'

geingur af 1 st. 18'

eda	" - 78'
tvö komástrif	" - 88'
vantar	" - 10'

Sjóstirnib vantar þá 10' eda $\frac{10}{4}$ strifis, til að komast í austurlandsubur, þegar Arktúrus geingur undir á hvorjum deigi.

Nú er að sýna, hvurnig finna meigi sóltímann, eda hvað frammorðid sé á klukkunni. Set jeg það væri á Mikaelsmessu, að menn vilbu finna upp komu, hágaungu og nidurgaungu Arktúrusar.

Uppkomunnar stjornutími	4 ft. 35'
Sólarinnar vorknútsfjærd	12 - 24'
(24 + 4 - 12 = 16)	16 ft. 11'

Þetta þýðir, að Arktúrus komi upp kl. 4, 11' f. m. Hér má raunar bæta við 1', því sólarinnar vorknútsfjærd er ekki 12 ft. 24', fyrr enn um miðjan dag. Arktúrus kemur þá upp kl. 4, 12' f. m.

Hágaungunnar stjornutími

eda vorknútsfjærd Arktúrus	14 ft. 9'
Sólarinnar vorknútsfjærd	12 - 24'
	<u>1 ft. 45'</u>

Þetta þýðir, að Arktúrus hágangi kl. 1, 45' e. m. Hér má vorknútsfjærd sólarinnar halda sér.

Nidurgaungunnar stjornutími	23 ft. 43'
Sólarinnar vorknútsfjærd	12 - 24'
	<u>11 ft. 19'</u>

Hér eru líðnar nærri tvisvar 6 stundir frá hádeigi, má því bæta 2' við vorknútsfjærd sólarinnar, enn þar hún dregst frá, þá verður það kl. 11, 21' e. m., að Arktúrus geingur undir.

Arktúrus geingur allta hátt, sem sólin, þann 20sta maí og 20sta júl; kemur upp nálægt norðurhællu landnordri, 54° frá fullu austri, og geingur undir í norðurhællu útnordri, 54° frá fullu vestri. Vilji maður vita stjörnu í Nautamanni, sem geingur upp í réttu landnordri, og niður í réttu útnordri, þá er það Ψ og Υ psilon, sem jeg hygg menn geti fundid eftir áður sögdu. Undir fótum Nautamannsins er Mænalfjallid, og fyllir það bilid á milli Nautamannsins og Tómsfrúarinnar, enn hefur aungvar so stórar stjörnur, að verdt sé hér að telja.

16. Veidihundarnir.

Þeir eru manni til hægri handar við Nautamanninn, undir hala stóra Bjarnarins. Þeir eru tveir, og heita Asterion og Kara. Kara er audþekktur af einni stjörnu þriðju stærðar á helkinu, heitir sú stjarna (latínsla litla) α í Kara, ellegar Karls (annars) hjarta. Þessi stjarna stendur í beinni línu við Alpha Drekanis og Mizar í stóra Birni, og er Mizar á þriðjungi vegar þar á milli. Karshjarta er líka í beinni stefnu við Dubhe og Gamma í stóra Birni, og má kalla, að Gamma sé á þriðjungi vegar milli Dubhe og Karshjarta. Hægra meigin við Karshjarta er stjarna (4), á trýni þessa hunds, á stefnunni frá Karshjarta til Chi í stóra Birni, á þriðjungi þess vegar, og heitir hún (litla latínsla) δ í Kara. Ekki nær Kara leingra til vinstri, enn sem tvo þriðjunga millibilsins, sem er á milli Karshjarta og Arktúrus. Milli Karshjarta og Venetnasch, eða á milli Kara og vinstra handleggisins á Nautamanni,

er hinn efri Veidihundurinn, Asterion, og snyr hann, einn og Kara, höfðinu upp í hægri hönd þeim, sem á hann horfir. Allar aðrar stjörnur í Veidihundunum eru smáar; ganga heldur ekki undir á Íslandi, þó snertir hægra apturlappar klóin á Kara sjónbeildarhring á fundurlandi.

17. Bernikuhaddur.

Bernika (Berenice), kona Ptolomeusar Evergetes í Egyptalandi, hafði fallest hár; helgadi hún það Venus, og var það sett á medal stjarnanna; þóttust menn finna það á milli Arktúrs og apturfótarklóarinnar á stóra Birninum, er þar mikil þyrping af smáum stjörnum. Medal þeirra eru nokkrar fjórðu stærðar. Sumar þeirra ganga undir á Íslandi.

18. Nordurkórónan.

Skálbín eigna þessa kórónu henni Ariadne, dóttur Mínos kóngs og Pasiphae á Krit. Á þridjungí leidar frá Arktúrus til Blástjörnunnar, þó lítið neðar enn á beinni stefnu, finnur maður hálfhring af stjörnum, rétt á eptir Nautamanni, það er Nordurkórónan. Í henni er ein stjarnan, sem tekur hinum framm, og heitir Alpha Kórónunnar, eða Gimsteinn (Gemma), og er annarar stærðar; enn rétt á eptir henni, eða vinstra meigin við hana, eru þrjár stjörnur fjórðu stærðar, sem heita Gamma, Delta og Epsilon, frá Alpha að reikna. Enn mitt á milli Alpha Kórónunnar, og Delta Nautamanns, er Beta Kórónunnar, sem er (4), enn fyrir ofan Beta er Peta (4). Þessar sex stjörnur mynda hálfhring, Peta, Beta,

Alpha, Gamma, Delta og Epsilon í Kórónunni. Beta Kórónunnar heitir á arabísku Musakan. Þegar Arktúse er í vesturútnordri, þá er Kórónan í norduthöllu vestri, nærri þrem sínum herra á lopti, eða meir enn tvöfalda herra á lopti. Ef Blástjarnan er í útsudri, þá er Kórónan í vestri, nærfeldd helmingi lægra. Einn nákvæmlega finnst, hvar Kórónan er, af vorknútsfjærd og midbaugsfjærd, sem hér stendur:

	Vorknútsfjærd.	Arðs. færsla.	Midbaugsfjærd.	Arðs. færsla.
Gimsteinn	15 ft. 27' 6"	2",5	27° 14' 29"	12",4

Flestar stjörnur í Kórónunni eru mوندulsvæðisstjörnur; þó geingur hún þannig í nordri, að hún sunnanlands rétt setst niður á sjóndeildarhringinn, enn eingin af hennar stóru stjörnum ganga þó undir; samt eru nokkrar mjög smáar stjörnur í henni, sem dálitla stund ganga undir.

19. H a r p a n.

A latínu kallast Harpan Lyra, og á þessi himinharpa að vera Orpheusar harpa. Sú stærsta stjarna í Harpunni er Blástjarnan, sem allir Íslendingar þekkja. Hún er af stjörnufróðum köllud Alpha í Harpunni, og á arabísku Vega. A flá vid hana vinstra meigin niður á vid eru tvær stjörnur þriðju stærðar, sem heita Beta (Sheliak) sú nálægari, og Gamma (Sulaphat) hin fjærlægari. Einn nálægt því á midri leid frá þessum tveimur til Blástjörunnar er Delta fjórðu stærðar.

Blástjornunnar vorknútsfjærd er 18 st 31' 41"

 Kræfærsla + 2"

 Midbaugsfjærd 38° 38' 37"

 Kræfærsla + 3"

Uf eptirfylgjandi toflu má sjá, hvað frammorðid er, þá Blástjarnan sést, viti maður líka vorknútsfjærd sólarinnar þann dag, því stjornutíðin, að frádreiginni vorknútsfjærd sólarinnar, gefur sóltímann, eða hvað flukkan er í sama munda.

Blástjornunnar stjornutíð í ýmsum ártum.

Utt, sem Blástjarnan er í.	Utgáttumth.	Stjornutíð á midju Fælandi, hvar breidd er 65°	1 fítt áttavíða.	2 fítt áttavíða.	3 fítt áttavíða.
Nordur	180°	6 stundir 31 mín. 41"	57	114	171
Vandnordur	135°	10 — 18 — 29"	55	110	166
Kustur	90°	13 — 59 — 15"	40	80	121
Landfudur	45°	16 — 40 — 56"	27	55	83
Sudur	0°	18 — 31 — 41"	27	55	83
Utsudur	45°	20 — 22 — 26"	40	81	121
Vestur	90°	23 — 4 — 7"	55	110	165
Utnordur	135°	2 — 44 — 53"	57	113	170

Dæmi. A jölanóttina fílyði maður sjá Blástjornuna í vestri, þá er stjornutíð 23 stundir 4 mínútur, vorknútsfjærd sólar þann dag er hér um bil 18 stundir 10'; þá so: 23 st. 4'

. 18 • 10'

þá er . . . fl. 4 54' e. m.

Aptur skyldi hann koma út, og sjá Blástjörnuna í útnordri, hvað er þá frammorðid?

Stjornutími 2 stundir 45'

Sólarinnar vorknútsfjærd 18 — 10'

þá er kl. 8 — 35' e. m.

Hér er nefnilega bætt 24 stundum við 2 stundirnar, þar ánnars ekki varð frádreigid. Enn vorknútsfjærd sólarinnar ver um 1 mínútu á hvurjum 6 stundum, so hér má, ef vill, draga 1 mínútu frá aptur, þar lidnar eru meir enn 6 stundir frá hábeigi, so að réttu lagi er kl. 8, 34' e. m.

Þ þridja sinn skyldi hann koma út þá sömu nótt, og sjá Blástjörnuna í landnordri, þá er

Stjornutími 10 stundir 18'

Vorknútsfjærd sólar 18 — 10'

kl. 16 — 8'

Enn kl. 16 merkir kl. 4 f. m., því hér á að kasta burt 12 stundum, og halda afganginum, þegar yfirgeingur 12 stundir. Hér varð líka, eins og í öðru dæminu, að taka til láns 24 stundir, so yrði 34, þar sem áður var 10 stundir. Nú eru líka meira, enn tvisvar 6 stundir, lidnar frá hábeigi, má því fella 2 mínútur af, so þá er kl. 4, 6' f. m. Hér vil jeg setja töblukorn, er seigir hér um bil vorknútsfjærdir sólarinnar þá daga, er þær standa rétt á heilum stundum, þá tíð ársins, er stjornur sjáft á Íslandi.

21 júlí 8 stundir 0 mín.

5 ágúst 9 — 0 —

21 ágúst 10 — 0 —

7 september 11 — 0 —

23 septemb.	12	—	0	—
10 október.	13	—	0	—
26 október.	14	—	0	—
10 nóvember	15	—	0	—
25 nóvember	16	—	0	—
9 desember	17	—	0	—
22 desember	18	—	0	—
4 janúar.	19	—	0	—
18 janúar.	20	—	0	—
2 febrúar.	21	—	0	—
17 febrúar.	22	—	0	—
5 mars.	23	—	0	—
21 mars.	0	—	0	—
6 apríl	1	—	0	—
23 apríl	2	—	0	—
8 maí	3	—	0	—
24 maí	4	—	0	—

Til að finna vorknútsfjærd sólarinnar á þeim dögum, sem eru milli hinna hér tölbu, þá má margfalda með 4 dagatölu þá, sem líðin er, frá þeim næsta hér talda deigi á undan, þá koma mínúturnar, sem fylgja stundinni, sem í tölunni stendur, t. d. þann 24da desember eru tveir dagar líðnir frá 22 desember, er stendur í tölunni, þá er 4 sinnum 2 = 8; þá er vorknútsfjærdin 18 st. 8'; og munar það 2 mínútur frá því, sem hér að framan er gjört ráð fyrir, eða 18 st. 10 mín. þann 24 desember. Til þess menn með sama hætti geti brúkad Sjöstirnib, þá vil jeg setja hér Sjöstirnibins stjörnutíma í ýmsum áttum.

Sjóstirnisins stjornutími í ýmsum áttum.

Átt, Sjö- stirnisins	Ázi- muth.	Stjornutími á midju Íslandi, á breidd 65 ^o			1 fret á raoita.	2 fret á raoita.	3 fret á raoita.		
Nordur	180 ^o	15	stundir	38 min.	16 ^u	50	100	150	
Landnordur	135 ^o	18	—	58	—	30 ^a	52	103	155
Kustur	90 ^o	22	—	25	—	21 ^u	44	88	132
Landfudur	45 ^o	1	—	21	—	3 ^u	34	68	103
Sudur	0 ^o	3	—	38	—	16 ^u	34	68	103
Utsudur	45 ^o	5	—	55	—	29 ^u	44	88	132
Bestur	90 ^o	8	—	51	—	11 ^u	52	103	155
Utnordur	135 ^o	12	—	18	—	2 ^u	50	100	150

Þeir þrjú dálkar hægra meigin í Sjóstjörnu- og Blástjörnu-töblunum seigja, hvað margar mínútur skuli vidleggja, ef stjarnan er geingin eitt, tvö eða þrjú strif úr áttinni, sem nefnd er vinstra meigin í töblunni, það er að skilja, strif á áttavitanum (kompásnum), því að á honum eru þrjú strif á milli hvorra tveggja af þeim nefndu áttum vinstra meigin, og skipta þau bilinu í 4 jafna parta. Þegar maður hefur þá áður markað sér bilid á sjöndeildarhringnum, þá getur hann með auganu skipt því í fjóra jafna parta, og séð so, hvar stjarnan er upp yfir. Wenn geta midlad bilinu enn smærra í so marga parta, sem vill, og eptir því skamtad tölur úr dálkunum, til að leggja við eða taka frá, t. d. á Þálsmeisu þann 25ta janúar. Skildi einhver sjá Sjóstirnib vanta hálfst áttavitastrif, til að vera komid í vestur. Þá er eptir áðursegdu.

Stjornutími í útsudri	5 stundir	55'
þrjú strif	"	132'
hálf strif	"	22'
Stjornutíminn rétti	8 stundir	29'

Ellegar þannig:

Stjornutími í vestri	8 stundir	51'
hálf strif frá	"	22'
Stjornutíminn rétti	8 stundir	29'
Þorknútsfjærd sólar	20 —	28'

fl. 12, 1' e. m.

Aframhald sólar	2'
---------------------------	----

fl. 11, 59' e. m.

Það er því á Þálsmesku, að Sjöstirnid vantar hálftrif kompásstrif, til að komast í fullt vestur á miðnætti. Enn seinast í janúar, eða eiginlega þann 30sta janúar, nær hún fullu vestri á miðnætti.

Þessi er áður getid, þá talad var um að finna norðrið af mændulsjörnunni, að Sjöstirnid mætti ekki komast í fullt landsudur, heldur yrði að vanta 19'. Nú þar eitt strif á áttavítanum gjörir 44' austan til við landsudur, þá verda þær 19', sem útmælast eiga, sama sem hálftrif, og það laft; ellegar verður einn hægt, að mæla sér út $\frac{1}{2}$ af bilinu milli landsudurs og austurs, og láta so stjörnunna bera þar yfir. Í útnordrinu átti stjarnan að ganga 45' úr útnordri; þar gjörir 1 kompásstrif 50', so þar á, að mæla laft kompásstrif, eða $\frac{1}{4}$ eða $\frac{2}{3}$ eða $\frac{3}{4}$ úr bilinu milli útnordurs og nordurs.

Þann sama máta, sem hér á undan var sýndur má brúka, til að snúa stjornutíma í sóltíma, hvurnig

sem stjörnutíminn er feinginn; so sem ef vér sjáum há-
gaungu einhverrar stjörnu, og veit hennar vorknúts-
fjærd, því þá er vorknútsfjærdin sama sem stjörnu-
tíminn, ef hún er framsfett í stundum og mínútum,
eins og hér að framan er gjört, enn sé hún framm-
fett í gráðum og mínútum, verður að deila henni með
15, eins og sagt er í Stjörnufræðinni, bls. 193, og
sem hér að framan við stjörnuna Dubhe er sýnt.

20. H e r F u l e s.

Þetta merki á að vera æfinleg minning Herkúle-
esar hins frækna frá Debu, er var sonur Amphitry-
óns og Alkmenu. Hann hefur í hægri hendi klyfu,
og í vinstri vítishundinn Cerberus, sem er þríhöfð-
aður höggormur. Herkúles er stórt svæði milli kór-
ónunnar og hörpunnar, og er nidur undan dreka-
höfðinu, í hvarri átt sem það er. Enn það er sér-
legt, að hann stendur fyrir ofs ætíð á höfði. Fyrir
neðan Beta er Gamma á Drekan's höfði, nokkud
leingra frá þeim, enn á milli þeirra, þá stendur
Dota (4) í Herkúlesi, á vinstra fótar mjóaleggi.
Enn á milli Kórónunnar og þessara stjarna eru tvær
stjörnur (4); heitir sú neðri Sigma, og hin efri
Dá. Sigma er á hægri læri, enn Dá á kné.
Fyrir neðan Sigma, í beinni línu við Dá og Sigma,
er Eta (3), álíka langt frá Sigma, sem Dá er. A
beinni stefnu milli Gimsteinsins og Blástjörunnar er
tvístjarnan Beta (3), og er hún $\frac{2}{3}$ vegar frá Gim-
steini. Þessi Beta í Herkúlesi er sú stjarna sem
menn halda, að sólkervi vort stefni á. Sjá Stjörnu-
fræðina bls. 152. Skammt á eptir Beta er stjarna

(3), sem heitir Epsilon, stendur hún lítið nedar enn Zeta, ef hún er í súdri, enn álíka hátt, ef þær eru í vestri. Þessar stjornur, Zeta og Epsilon, eru á búk Herkúlesar. Dragi menn línu í gegnum Zeta, þannig að hún hægri meigin snerti kórónuna; nedarverda, þá hittir hún vinstri meigin þrjár stjornur saman á vinstri læri Herkúlesar, þær heita eptir röð, frá Zeta að telja, μ , ϵ og δ , og eru (3), (5) og (4) stærðar. Stjornurnar Zeta, Epsilon, μ og Eta myndu nokkud skalkann ferhyrning. Skalkhornslínan gegnum Eta og Epsilon, leingd niður á við, geingur ofan á milli tveggja stjarna, er taka öðrum frammi á því svæði, er sú til vinstri handar stærri, og á ekki heima í Herkúlesi, heldur í Radurvalda, heitir Alpha í Radurvalda og á Arabísku Ras Alhague; og er annarar stærðar. Hin, sem er til hægri handar, er þriðju stærðar, og á heima í Herkúlesi, hún heitir Alpha eða Ras Algethi, er hún á höfði eða enni hans. Lína, dreigin frá Ras Algethi til Gimsteinsins, geingur á midjum veigi mitt á milli tveggja stjarna (3), á hægri eðl Herkúlesar; heitir sú efri Beta, og hin nedri Gamma. A stefnunni frá þessum Beta og Gamma í Herkúlesi, til Beta og Gamma í Hörpunni, verda fyrst fyrir manni þrjár stjornur nærri saman, allar fjórðu stærðar, heita Delta, α og Lambda í Herkúlesi. Þær eru á hægri upphandleggi hans. Enn á frammandleggunum eru η (4), ξ (4), θ (4), og λ (4). Þær eru nærfeldt í þeirri röð: α , Lambda, η , ξ og λ . Stjarnan Lambda í Herkúlesi heitir á arabísku Maashm, enn Beta í Herkúlesi heitir Korneforos. Í hægri hendi heldur Herkúles á Ser:

beruð og á víðargrein til samans, og eru þetta margar smáar stjornur fyrir neðan hendina, og nær fá klasi niður á móti við Ras Algethi.

Ras Algethis vorknútsfjærd	17 ft. 7' 34"
Arðbreyting	+ 2",7
Mibbaugsfjærd	14 ^o 34' 24"
Arðbreyting	— — 4",5
hálfri dagbogi	8 ft. 21' "
Kusturídd	36 ^o 32' " 32
Vesturídd	eins.

Þær stjornur í Herkúlesi, sem eru hærra enn Maasym, ganga ekki undir á Íslandi, og eru því mوندulsvæðisstjornur. Þar á móti ganga þær undir á Íslandi, sem eru fyrir neðan Maasym.

21. Nadurvaldi og Nadurinn.

Á latínu eða grísku heitir hann *Serpentarius* og *Ophiuchus*. Þetta á að vera sá nafnendi læknir *Esculapius* Apollonsson; móður hans var *Kórónis* kóngsdóttir frá Þessálfu. Nadurinn eða höggormurinn á að merkja viturleik þessa læknis. Nadurvaldinn er fyrir neðan eða sunnan Herkúles, og nær ofan að Spordbrekamerki. Austan til við Ras Algethi í Herkúlesi stendur Ras Alhague í Nadurvalda, sem áður er sagt. Þessi Ras Alhague eða Alpha í Nadurvalda. Sé dreigin lína frá Delta í Herkúlesi í gegnum Ras Alhague, og henni á framm haldið laflega annann einn veg, þá er komið á hægri øxl Nadurvalda, eru þar tvær stjornur þriðju stærðar, Beta og Gamma Nadur-

valda. Beta heitir líka á arabísku Celbatrai. Sé þessari sömu stefnu enn nú leingra á framhaldid, annad eins bil, þá kemur stjarna (3), er heitir Zeta Höggormsins. Enn leingra nidur, álíka langt, þó heldur hægra meigin við sömu stefnu, koma tvær stjornur Tá (5), og Ypsilon (4); þessar eru á hægri hendi Nadurvalda, með hvurri hann heldur utanum höggorminn. Hægra meigin við Rað Alhague, nokkud nidur á við, er vinstri oxlin, álíka langt frá Rað Alhague, sem hin oxlin, eru þar tvær stjornur (4) saman, Tóta sú efri, Kappa sú nedri, leingra nidur til hægri handar, á stefnu frá Rað Algethi í Herkúlesi, og gegnum Kappa, er á vinstra handleggi Nadurvalda, Lambda í Nadurvalda, sem er (4); Lambda er álíka langt frá Kappa, sem Kappa er frá Alhague. Enn leingra nidur til hægri handar, á stefnunni gegnum Tóta og Lambda, koma tvær stjornur (3), er heita: Delta sú efri, enn Epsilon sú nedri. Báðar þær heita líka Yed, og adgreinast með ordunum: fremri og aptari. Þær eru á vinstri hendi Nadurvalda, með hvurri hann heldur um höggorminn. Fyrir nedan þær til vinstri handar, nærri í rétttri stefnu við þær, er Zeta Nadurvalda, sem er (4), og enn nú í sömu stefnu, leingra austur og nidur, er stjarna (3), sem heitir Eta í Nadurvalda. Þessar tvær, Zeta og Eta, eru sín á hvurju kné Nadurvalda. Á fætinum eða mjóleggnum hægra, fyrir nedan hægra kné Eta, er stjarna (4), í beinni stefnu við Lambda og Eta, og heitir hún Ró í Nadurvalda, og flammt fyrir nedan hana, á tánum á sama fæti, eru tvær stjornur saman, heitir sú, sem

undan geingur, ρ eta (3), og sú, sem á eftir er, og lítið hærra stendur, β í nadurvalda; hún er (4). Þessar báðar eru einar þær fydstu stjornur, sem sénar verða frá Íslandi, og það einasta, þegar þær eru í subri. Á stefnunni milli beggja handanna, þó nærri hjá hægri hendi, er stjarna (4), sem heitir μ í Nadurvalda. Nú er eftir að lýsa Höggorminum. Höfud hans og háls eru undir Rórónunni. Sú stærsta af þeim er α í Höggormi (2), á arabísku Unukalhay. Hún er nærri á beinni línu við κ Alhague og ζ í Nadurvalda, eða við höfudid og vinstri øxl hans. Ofan til við Unukalhay er stjarna (4), er heitir λ í Höggorminum. Á leidinni frá Unukalhay niður til γ , þó flammt frá Unukalhay, er ϵ Höggormsins (3); enn upp á við á sömu stefnu í gegnum γ og Unukalhay, flammt frá Unukalhay, er δ Höggormsins (3). Á veiginum frá δ upp til Rórónunnar, á rúmum þridjungi vegar, er β (3), á höfðinu, og vinstra meigin við hana, eða á eftir henni, er γ (3), á kalli höggormsins. Fyrir ofan þessar er fyrst κ (4), og síðan enn hærra ν (3), og loksins undir ϵ Rórónunnar stjarna (4), er heitir ν Höggormsins. κ og ν eru á trjónu Höggormsins. Fyrir neðan ϵ , álíka langt, sem frá ϵ er til δ , er stjarna (4), sem heitir μ í Höggorminum. Stefnilínan á milli β og μ geingur ofan á milli Unukalhay og ϵ , og verður Unukalhay nærfelldt á midju. Þér með er þá búin lýsingin á höfði og hálsi Höggormsins. Midpartur Höggormsins geingur fyrst í gegnum

vinstri greip Nádurvalda, vefst síðan yfir um frammandlegginn og aptur fyrir vinstra lærib, kemur so framm á milli læranna, liggur so ofan á hægri lærinu, og er þar stjarna (4), á beinni stefnu milli Eta á hægri kú Nádurvalda, og My Nádurvalda, heitir sú stjarna My Hoggormsins; er hún á þridjuungi vegar milli þessara stjarna Eta og My. Eptir þetta geingur Hoggormurinn gegnum hægri greipina, bengist síðan upp á vid, og kemur þar stjarnan, Beta Hoggormsins, sem áður er sagt; síðan hringbengist Hoggormurinn, þegar kemur upp undir Róngsurann, setur síðan á sig inkkju, og á henni er Eta Hoggormsins (4), flammt á eptir Beta Hoggormsins, viflifa langt, eins og er milli Beta og hægri handar Nádurvalda, hvar stjörnurnar Lá og Upsilon Nádurvalda standa. Loksins endar Hoggormshalinn á stjörnunni Peta, sem er tvístjarna. Hún er nærri á beinni stefnu frá stjörnunum Ras Algethi og Ras Alhague, lífa nokkurn veiginn á stefnunni frá hægri hendi Nádurvalda gegnum Eta Hoggormsins, þegar henni er so á framm haldbid, að Eta verbi nærri á midju; það er að flilja, að Eta verbi nærri mitt á milli Upsilon og Peta. Þessi Peta er þridju stærðar.

Ras Alhagues vorknútsfjærd	17 ft. 27' 43"
Arðfærsla	= + . . . 2",8
Mibbaugsfjærd	= + 12° 40' 45"
Arðfærsla	= - . . . 3",03
Hálfi náttbogi	4 stund. 4 mín.
Geiflabrotðverfun 7 mín.

Hálfi náttbogi, að frábregnu geisla- broti,	3 ft. 57 mín.
Ridriverutími	7 ft. 54'
Hálfi dagbogi	8 ft. 3'
Uppiverutími	16 — 6'
Pegar geislabrotid er talið með.	
Austur- og vesturvídd	31° 16'
enn með geislabroti	31° 43'
Uppkoma	9 ft. 24'
Ridurganga	1 — 30'

Þá Naturvalda er eingin mændulsvæðis stjarna, heldur gánga þær allar undir, það er að skilja á Íslandi; sama er að seigja um höggorminn, því stjarnan Þi geingur nærri í sjóndeildarhring á norðurlandi, enn þó gétur geislabrotid ekki lýpt henni so upp, að hún verði sjen.

22. Orn og Antínóus.

Þessi Orn skyldi vera sá, sem rænti þeim fagra únglingi Ganymedes, er var sonur Troð. Antínóus var sveinn nokkur fagur frá-Bithyníu, er var við byrd Hadriáns keisara. Orninn er þekktanlegur af þremur stjörnum í röð, sem gánga einni stund á eptir Blástjörnunni, enn helmíngi nedar; enn hún, í súdri. Þessi röð bendir líka nærfeldt á Blástjörnu-una. Frá Beta og Gamma í drelahöfðinu má draga línu í gegnum Blástjörnunna, og hún hittir nálægt þessum þremur stjörnum í Erainum. Í midid þessara stjarna er hin stærsta þeirra, heitir Alpha Arnaríns, og á arabísku Athair, hún er fyrstu stærðar. Landsfunnan til við hana er Beta, og útnordan

til er Gamma, báðar þessar eru þriðju stærðar. Beta snýr frá Bláskjörnunni, enn Gamma að henni. Uthair kallast líka Altair, Beta kallast Alfheim og Gamma Tarazed. Skammt frá þessum stjörnum, á leiðinni til Herkúlíesar, eru tvær stjórnur nálægt hvor annari, Zeta og Epsilon, sú er Zeta, sem nær er Altair, þær eru (3), og standa á stéti Arnarins. Þær eru miðsvegur milli Altair og Cerberus. Vestur og niður undan Altair, þó talsverdt nær enn Zeta, er stjarna þriðju stærðar á syðra vængnum, er heitir Delta. Fyrir undan Altair eru fjórar stjórnur þriðju stærðar, sem mynda skalkferhyrning í Antinóus, Eta á hægri öxl er hin essta Þeta á hægri hendi austur og niður frá Eta, Zóta á búi vestur og niður undan Eta, og Kappa á kné niður undan Zótu. Í þessum ferhyrningi er hliðin milli Eta og Zóta nærri samsíða þeirri á milli Þeta og Kappa, og þessi síðari er meir, enn tvöfalda leingri, enn hin fyrri. Sé nú þessi styttri hlið, Eta Zóta, leingd til hægri handar, so hún verði nærri þreföld, þá kemur stjarna þriðju stærðar á hægri fótar rist, er heitir Lambda í Antinóus.

Altairs vorknútsfjærd	19 stund. 43' 13"
Árðbreyting	" " 2",9
Miðbaugsfjærd	+ 8° 27' 53"
Árðbreyting	+ 9'
Hálfi dagbogi	7 stund. 20'
med geislabroti	7 — 14'
Uppiverutími	14 — 40'
Niðriverutími	9 — 20'
Uppfoma	12 — 23'
Niðurganga	3 — 3'

Austur- og vesturvíbb	20° 24'
med geislabroti	21° 56,

Hún kemur því upp nálægt austur landnordri, og geingur undir nálægt vesturútnordri.

Allar stjörnur í Erninum og Antínóusi ganga undir á Íslandi.

23. Sobjeshýs stjöldur.

Þetta stjörnumerki er nefnt í minningu hins þólfsta konungs Jóhans þriðja af Sobjeshý, er frelsaði Wínborg frá umfatri Tyrkja. Sobjeshýsstjöldur er með smáum stjörnum mitt í vetrarbrautinni, á milli Antínóus og Madurvalda. Á beinni stefnu milli Koppa í Antínóus og hægri handar Madurvalda, þar sem *Nj* og *Tá* eru, standa þrjár stjörnur saman í litlum þríhyrningi. Sú vestasta heitir *m* (4), sú austasta *n* (5), og sú neðsta *o* (5). Þessar eru á krossi Skjaldarins. Hér að auki eru þrjár stjörnur, *i*, *k*, *l*, fyrir vestan Lambda Antínóusar, þær eru allar fjórðu stærðar, og heita þessum bófstafansfnum í röð, vestur eftir frá Lambda Antínóusar að telja.

24. Kóngsxynn.

Þetta merki er nefnt í minningu hins þólfsta konungs Staníslaus Agústus af Póniatowshý, og þegar merkið er nefnt með fullu nafni, heitir það Kóngsxynn frá Póniatowshý. Enn fyrir þá skuld er það *Uxi* kallad, að þær stærstu stjörnur í því hafa fyrir afstöðu sína líkingu við *Uxamerki*, eða þær so nefndu (*Hyades*) Regn stjörnur. Sem eru þær merkilegu stjörnur í því, fyrir utan *Sjóstirnib*. Kóngsxynn stendur

í vetrarbrautinni milli Arnarins og hægri aklarinnor á Náburvalda, þar sem standa stjörnur Beta og Gamma í Náburvalda. Róngsbuxinn er líka, hvað hæðina snertir, fyrir ofan halann Höggormsins, og fyrir neðan Cerberus. Höfundur á Ura þessum er stjörnuþyrpingin, sem er austan til við stjörnur Beta og Gamma í Náburvalda.

25. Drin, Refurinn og Gæsinn.

Beint norðurundan Erninum eru þekktanlegar fjórar stjörnur, sem eru á Drinni: Alpha og Beta standa upp og ofan nærri hvor við aðra næst hægri hendi, aptan til á Drinni. Þar næst fyrir framan er Delta, og síðan Gamma. Allar þessar eru fjórðu stærðar. Þessi Dr á að vera sú, með hvarri Herkúles deydði Gamm þann, er nagadi lifrina hans Prometheusar á fjallinu Kálasus. Fyrir ofan Drina er Refurinn, sem nær upp undir Svaninn, eða á móts við stjörnuna Albireo í Svaninum. Refurinn heldur á Gæsinni, og snýr til vesturs, eða upp í hægri hönd mannsins. Í Refnum og Gæsinni eru einasta smáar stjörnur.

26. Höfrúgurinn.

Þessi Höfrúgur á að vera sá vinsamleigi höfrúgur, er tók hinn nafnfræga hörpuleikara Aríon frá Methymna upp á hrigg sér, og syndti til lands með hann, þegar honum hafði á sjóferð verid fastad útbýrdis. Hann er fyrir austan eða flammt á eptir föggu stjörnunum í Erninum, enn lítið eitt ofar, þó neðar enn Drin. Þar eru fjórar stjörnur þriðju

stærðar, sem mynda tígul, og standa þétt saman. Sú efri fremri heitir Alpha, sú nedri fremri Beta, sú efri aptari Gamma, og sú nedri aptari Delta. Síðan er bilkorni nedar hin fimmta stjarnan þriðju stærðar, og heitir Epsilon í Höfrúngnum. Alpha í Höfrúngnum, heitir líka Svalocin, og Beta, Rotanev. Um stjörnurnar í Höfrúngnum sýnir hér nægja að geta þess, að vorfnútsfjærd Höfrúngsins er 20 stundir og hálf, eða að hann hágeingur á miðri 21tu stundu stjörnutíðarinnar. Líka má geta þess, að miðbougssfjærdin er álíka mikil, sem áður umgetinna stjarna í Rað Algethi í Herkúlesi, og Rað Alhogue í Raburvalda, og hefur því sömu dagboga og niðurgangustaði, sem þær.

27. Svanurinn.

Um Svan þenna seigja skáldin, að sé Drpheus hörpuleikari, hvorn Baklusar prestinnur drápn, og gudirnir síðan umbreyttu í Svan, og settu meðal stjarnanna með hörpu sinni. Svanurinn er fyrir austan hörpuna, eða á eptir kenni. Svanurinn þekktist á fjórum stjörnum stærstum, er standa í kross, ásamt hinna fimmtu, er stendur á samkomum krossins. Krossinn liggur á ská frá landnordri til útsudurs, þegar Svanurinn er í hágaungu. Til landnordurs horfir, eða til vinstri handar og upp, stjarnan Alpha í Svaninum (2) eða Deneb, á stelli Svansins; á hana horfir stefnan í gegnum Beta og Gamma á höfði Drekaans. Hún geingur 2 stundum og 4 mínútum á eptir Blástjörnunni, enn er 6 gráðum hærra enn hún. Til útsudurs, eða til hægri handar og niður, horfir

á krossinum Beta í Svani, eða Albireo (3); á hana horfir stefna í gegnum Beta og Gamma í Hörpunni. Albireo er á nesi Svansins, og snýr nesið að Gæðinni, sem Refurinn heldur á milli Deneb og Albireo, hér um bil á fjórdungi bils, er Gamma í Svaninum (3) er líka heitir Sadr. Þar sameinast kjálkar krossins. Á milli Alpha og Gamma í Svaninum er sund í vetrarbrautina. Gamma stendur á brjósti Svansins. Albireo er líka austan til við línu þá, sem dreiginn er milli Blástjörnunnar og Altair. Á kjálkanum mót útnordri stendur Delta (3), hún snýr að dreka-höfðinu, þar sem Etanin er, enn á landsudurkjálkanum er Epsílon Svansins (3). Leingra mót landsudri er Beta (3), yfst á landsudurvængnum, og Mý (3) enn leingra mót landsudri, fyrir utan vænginn. Á stefnunni milli Deneb og Cepheusarkórónu, þó nokkud sunnan til við stefnu þessa, standa tvær stjörnur, hvor hjá annari, sú stærri og hærri (4), og sú nedri (5), heita báðar Pi, og sú stærri þar að auki Hazel-safage. Þessar eru hinar óptustu í Svaninum við enda stélsins. Hjá Gamma í Svaninum, þeim meigin, sem frá snýr Alpha, var nýja stjarnan, sem umgetur í Stjörnufræðinni bls. 146. Svanurinn er í vetrarbrautinni, og eru í honum einasta mوندulsvæðisstjörnur, enn Albireo kemur samt rétt nærri sjóndeildarhring í nordri, sunnanlands á Íslandi.

28. S e r f æ t l a n.

Á latínu heitir það merki Lacerta. Það er fyrir sunnan og sudaustan kórónu Cepheusar, og fyrir austan stélib á Svaninum, og fyrir vestan Fridriksheidur-

inn. Höfundur sýr að kórónu Cepheusar, fæturnir að Svaninum, og apturhlutinn að frammfótunum á Pegasus. Fersætlan hefur að einni smáar stjörnur, og allar eru þær mæðulsþæðisstjörnur.

29. P e g a s u s.

Þessi vængjafi hestur skýlbi hafa stólkid fram af blóði Medúsu, og með hófi sínum gjört það hestfar, er lindin Hippocrene frammball af. Hann fleygði Bellerophon niður af sér, og flaug loks til himins. Þetta stjörnumerki er þekktanlegt af fjórum stjörnum annarrar stærðar, er mynda jafnhlida ferhyrning, lagadan rétt einn og stákbord. Ein af hornstjörnum þessum er Alpha í Andrómedu. Hún er á því horninu, sem sýr upp vinstra meigin. Fyrir neðan Alpha Andrómedu, eða Sirrah, er Gamma í Pegasus, á neðra horni ferhyrningsins vinstra meigin, er hún á baki Pegasusar, því hann liggur á bakid. Þessi Gamma heitir líka Algínb, og er midjan veg á milli Alpha í Andrómedu og sjálfs vorknútsins, þannig að vorknúturinn er nærri rétt suður undan þessum báðum stjörnum. Á hæggra horninu efra á áður umgetnum ferhyrningi, stendur Beta í Pegasus, heitir hún líka Scheat, og er rétt einn hátt í subrí, sem Alpha í Andrómedu, sem er rétt austur undan henni, og er rúmlega stundar bil á milli þeirra. Rétt fyrir neðan Scheat, á hæggra og neðra horni ferhyrningsins, er Alpha í Pegasus, á arabísku Markab, og er hún rétt vestur undan Algínb, stendur einn hátt í subrí, og er lítið meira enn stundarbil á milli þeirra. Lína dreigja frá Alpha í Andrómedu

gegnum Alpha í Pegasus, og frammeingb til hægrí, rúmlega þriðja part, kemur að Beta (3) á miðjum hálsi Pegasusar. Sé sömu stefnulínu enn leingra áframm haldbí, nærri einö langt frá Markab, sem Markab er frá Alpha Andrómedu, eða Sirrah, þá kemur að stjörnu fjórðu stærðar, sem heitir Peta. Hún er aptan við auga Pegasusar. Í stefnulínu frá Drinni, í gegnum tígul Höfrúngsins, er stjarna (3) á neö Pegasusar, er heitir Epsílon í Pegasus eða Enif. Hægra meigin við Scheat, og lítið ofar, á veiginum til Deneb stammt eitt, er Eta (3), og neðan hana Smítron (5). Nú, árið 1845, er vorknútsfjærb stjörnuunar Algenib 0 st. 5' 14", og vex árlega 3"; er því auðséd, að vorknúturinn er helður fyrir vestan Algenib, og að sá miömunur fer vaxandi. Það er því ekki nákvæm regla, til að finna vorknútinn á himninum, að láta Alpha í Andrómedu og Gamma í Pegasus vísa sér á hann, rétt niður undan báðum þeim. Miðbaugsfjærdin stjörnuunar Algenib er 14° 19' 18", og vex hún árlega 20". Vorknútsfjærb stjörnuunar Markab er 22 stundir 57' 2", enn eykst árlega 3"; það er því 1 stund 8 mín. í vorknútsfjærb milli Algenib og Markab, er því vorknúturinn so mikil vestar enn Algenib, sem svarar $\frac{5}{8}$ bilins milli Algenib og Markab. Hægast verður því að finna vorknútinn á himninum með því móti, að láta fyrst Markab háganga, eða komast í hádeigis stöðinn, mæla so tíma á klukkunni, 63 mínútur í stjörnutíð, sem er 62' 50" í miðlungsóltíð, eptir hvurri klukkur vorar hér um bil gánga. Þegar þá 1 stund og 3 mínútur lafar eru líðnar frá hágaungu

Markab, þá er vorfnúturinn í hábeigistöð, enn eins langt nedar enn Algenib, sem Algenib er nedar enn Sirrah, eða Alpha í Andrómedu, og þó enn nú hálfri gráðu nedar. Naunar er vorfnúturinn í fiska-merki, enn þar eru einasta mjög smáar stjörnur, so ekki er auggjört að hnitmíða niður vorfnútinn eptir þeim. Miðbaugsfjærd stjörnunnar Markab er $14^{\circ} 22' 26''$ til norður, og færst árlega norður á $19''$. Sér af sýtur þá, að sá hálfri dagbogi fyrir Markab er 8 stundir $19'$ að meðtöldu geislabrotinu, hvar af geislabrotstíðin er 6 mínútur. Líkt er þetta allt, hvað áhrævir Algenib; enn gánger þeirra er líkur sólarinnar gánger þann 29da apríl og 15da ágúst.

30 S o l i n n.

Þessi foli á að vera sá, sem Merkúríus gaf Raftar, og sem hét Cellarið. Á himninum er ekki myndad af honum nema höfundid, og er það þekktanlegt af fjórum stjörnum, sem gjöra skalkferhyrning, og eru fjórðu stærðar, og eru á milli Höfrungbíns og höfudsíns á Pegabú. Þær tvær efri heita Delta og Gamma, er standa saman mitt á milli Enif og Epsílon Höfrungbíns; heitir sú Delta, sem nær er Enif. Fyrir nedar þær eru Beta og Alpha í Folanum, og heitir sú Beta, sem nær er Enif. Hin eða Alpha heitir á arabísku Kitalþar. Delta og Gamma eru á munnri Folan, enn Alpha og Beta eru sín hvorju meigin við augað.

31. Sridriksheidurinn.

Þetta merki hefir stjörnuspekingurinn Bode nefat

í minningu Fridriks onnars Prussakonungs; það innibindur í sér sverð, lárberjagrein kórónu o. s. fr.

Þetta merki er fyrir landsunnan Cepheusar kórónu, á milli Fersærlunnar og hægra handleggðins á Andrómedu. Milli Sirrah í Andrómedu og Kórónu Cepheusar eru þrjár stjörnur fjórðu stærðar, sem taka öllum öðrum framm á því svæði, þær heita frá Sirrah að telja, Zóta, Kappa og Lambda. Sumir Stjörnuvitringar eigna þær Andrómedu, enn aðrir Fridriks heidri. Hinor aðrar stjörnurnar í Fridriksheidri er hét ekki verdt að telja vegna smæðar þeirra. Vorknútsfjærd Fridriks heidurs er frá 22 stund. 10' til 23 st. 48', enn midbaugsfjærd frá 34° til 55° til nordurs. Eru þar því allar stjörnurnar mوندulsvæðis stjörnur.

32. Ferschels sjónpípan.

Hún liggur með fremra endann á hægri øxl Okumanns, hvor Beta í Okumanni eða Menkalinan er, en hinn aptará enda á höfði Kastors í Tviburamerki. Sjónpípa þessi með umbúningi sínum fyllir bil það, sem er milli hægra handleggðs á Okumanni og Tigrisdýrsins. Það er að skilja, að Tigrisdýrid er fyrir ofan og austan, Okumodur fyrir vestan, og Tviburamerki fyrir neðan, þegar Sjónpípan er í súdri. Þar eru smáar stjörnur, sem ekki er verdt að lýsa. Vorknútsfjærdir frá 6 st. 3' til 7 st. 39', og midbaugsfjærdir frá 33° til 46° nordan midbaug.

33. Múrfvadrantur.

Þann er himinsettur fyrir ofan Nautamann, aust-

an Nautamannsins hönd, þar sem að eru sjörnurnar Peta, Jóta og Kappa í Dlumanni, fyrir sunnan Peta og Jóta í Nordurdreka, og fyrir vestan trjónu Drekans. Þar eru aungvar sjörnur teljandi. Borfnútsfjærd frá 14 st. 43' til 16 st. 4'; midbaugsfjærd frá 47° til 58° norður á við.

Endir fyrra partsins.

Skirsla

um Bessastada skóla

fyrir skólaárið 1844 — 1845.

Húsin á Bessastöðum eru lík því sem þau voru, þá heim var lýst í skirslu m. fyrir árið 1840 — 1841 bls. 12 og 13, bæði steinbyggingin, Loftid, hvar skólans bækur geimast, í Bessastada kirkju turnlofti og loftinu fyrir framan það, er geingur inná kirkjuloftid, og húsin fyrir austan steinhúsið; nema að gluggar og glugga umbúnaður í steinbyggingunni, og þakid á eystri hliðinni er víða farid að leka núlid, sem von er til, því þó að þakid hafi verid vel tjargað á hverju ári, þá var yfirúðin ekki af góðum vid gjörð, þegar hún fyrir hérumbil 20 árum var álagð. Jantra þakid er eun nú víðast hvar gott, þó það sé meira enn 70 ára gamalt, því það hefir í öndverdu gjört verid af góðum kostum; er því nýr vottur þess, hværsu lítill sparnatur það er, að sjá um of í dýrleika þess víðar, sem brúkast á til húsa; allrahelst ef stórbyggingar eru. Beggirni á steinhúsinu eru óbilgir; en þó gluggar og gluggakistur séu súnar ordnar, er það ekki furða, því síðan eg fyrst man til, fyrir hérumbil 50 — 60 árum, man eg

ei til að nokkur höfund; endurbót hafi á þeim verið gjörd, og síft síðustu árin, eptir það að til umtals kom, að flýta skólan aptur inni Reykjavík; þess vegna var líka í fyrra sumar sem minnst við húsid gjört sem verða mátti, þaræð menn álitu það þá sem fullvíst, að skólinn flýttist til Reykjavíkur að ári lidnu, nefnilega næstkomandi haust 1845; svo nú verður nandsyn á, að gæra nokkud meira við húsid; helst við þakid á austurhlidinni, og gluggana á austurhlidinni og suburgastinum. Hin húsinn vil eg ekki nefna, þau falla sínum herra; og ekki heldur nefni eg loptid í kirkjunni, hvar bætur skólans geimast. Það hefir verið nefnt í skírslum mínum undanfarin ár¹.

Ætlad var til að 40 reglulegir lærisveinar yrðu í Bessastabaskóla þetta nú lidna skóla ár, eins og þau fyrirfarandi; vörn því 8 nýir lærisveinar innteknit í skólann í sumar er var, í stad þeirra 8 er við skólan skildu vorid 1844, nefnilega 5 voru útskrifadur í Maio og 2 drukknuðu (sjá skírslu m. fyrir ár 1843—1844 bls. 10), og Björn Saldórsson, sem þá gat ekki yfirheyrst vegna sjúkdóms, lét sig síðar, þann 8da Júlí, opinberlega yfirheyra og tókst honum á þá leid, sem Tablan A sýnir. Í þeirra burt:

¹) Þandinu til flámmar væri það, ef til þess skýldi koma, að kirkjan á Bessastöðum skýldi verða að rúst; víssulega híd triggvast byggða hús á Íslandi hvað veggina snertir, sem standa munu, ef ekki af manna höndum verða niðurrífnir (er ekki mun verða fyrirhafnarlaus) á meðan Ísland er uþpl, og heyrst hefi eg að Ísinni, ef ekki 2þvar hafi stíklur verið tekinn til byggingar henni af öllum kirkjum í Íslandi, og er þó afkunnugt hvað flestar kirkjur hafa lítid að misfa.

T a f l a

um það, hvernig þeim lærisveini sem útskrifadist úr Bessastada Skóla, töfist í hverri lærðómsgrein útaf fyrir sig, í því opinbera lærðómsskrifi þann 8da Júlí 1844.

Nafn Lærisveinsins.	Latína.	lat. Stíll.	Gríska.	Danþka.	danfl. St.	isl. Stíll.	Hebreíska.	N. L. Utþyr.	Trúar- lærðómur.	Sagna- fræði.	Land- skipunarf.	Rúmmálg- fræði.	Talna fræði.	Þesub- tala.
Björn Haldóreson.	ág.	vel.	ág.	ág.	vel.	vel.	ág*.	ág.	dável.	vel.	ág.	ág.	dáv.	93.

Skgr. Stjarnan (*) merkir, að gríska þesir verid lesin ístab hebreísku.

Bessastada Skóla þann 8 Júlí 1844.

Steingrímur Jónsson.

Á. Helgason. J. Jónsson. H. Scheving. S. Egilsson. B. Gunlögsen. Á. Jónsson.

sjönu stad vóru þessir inntekur í skólanu þann 15da Júlí s. á. 1) Páll Fridr. Vidalsn, sonur Stúdents Jóns Thorarensens á Vididalstúngu. 2) Arni Thorsteins-son, sonur konferensráðs, B. Thorsteinsfons, amtmanns í Besturamtinu, N. af Dbr. og Dbrm. 3) Helgi Hálfdánarson, sonur prests Síra Hálfdánar Einarsfonar á Brjámslæk í Vardarstrandarsýslu. 4) Jakob Gudmunds-son, sonur bónda Gudmundar sál. Jónsfonar í Slaga- fjarðarsýslu. 5) Sveinn Skúla-son, sonur hreppstjóra Skúla sál. Sveinsfonar í Húuavatnsýslu. 6) Gud- brandur Vigfús-son, sonur bónda Gudbrandar Vigfús-sonar á Frakkanesi í Dalasýslu. 7) Haldór Gudmunds-son, sonur hreppstjóra Gudmundar sál. Jónsfonar á Drennistsdum í Mýrasýslu. 8) Þorfinnur Jónatans-son, sonur hreppstjóra Jónatans Þorfinnsfonar í Eya- fjarðarsýslu; og þaræð skólalærifveinn Gunnlaugur Guttorms-son úr Múlasýslu ekki gat til skólans komist vegna sjúkdóms, var þann 30ta Nóvemb., þá menn vóru úrkulavon- ar um komu hans í ár, pláts hans í skólanum veitt: 9) Aukalærifveini Jóni Þorvardarsyni, syni prests Síra Þorvardar Jónsfonar á Middel í Arnesfýslu; en þeirri hálfu slmusu, er nefndum Gunnlaugi var áður veitt, en gat ekki vegna lasleika síns haft gagn af í vetur, var bætt við áður feingna hálfu slmusu Jóns Snæbjörnsfonar frá Videy, sem þess vegna er nú á heillri slmusu.

Engum af þeim lærifveinum, sem umlíðid ár vóru inntekur í Bessastada-skóla, þesir nokkur slmusu verid veitt, hverki heil né hálf, en þar á móti var umlíðid sumar þessum af hinum eldri skólans lærifveinum, veitt hálf slmusu hverjum fyrir sig: A, í Efrabekk: 1) Benedict Gröndal. 2) Gunnlaugi Guttorms-soni. 3) Benedict Kristi-

ánsfyni. 4) Magnúsi Thorlacius. 5) Páli Jóns-
fyni. 6) Steffáni Gudnafyni. B, í Nedrabekki:
7) Brinjólfi Jónsfyni. 8) Gannesi Sinsen. 9) Bjarna
Thorlacius. 10) Magnúsi Grímssfyni. 11) Jóni
Sinsen. 12) Jóni Þórdarsfyni. 13) Fridriki B. Thor-
arensen. 14) Bergi Jónsfyni. og 15) Jóhannesi
Zaldórsfyni. Evo allir hafa nú í Efrabekki heila sl-
muðu, nema: Steffán Thordersen, Þórdur Jónassen,
Arni Thorsteinsson, og Páll Vidaliu, er hafa enga;
en Benedikt Gröndal, Gunnlaugur Guttormsson og
Steffán Gudnason hafa ei nema hálfá; og í Nedra-
bekki hefir Magnús Grímsson og Fridrik B Thorar-
ensu heila slmuðu; en Gannes Sinsen, Bjarni Thor-
lacius, Brinjólfur Jónsson, Jón Sinsen, Jón Þór-
arson, Bergur Jónsson og Jóhannes Zaldórs-
son hálfá. Hinir í Nedrabekki enga. sem eru þeir, er inntel-
ir vóru í skólum í hausti ed var (1844), nefnilega Nr.
10 — 15 eptir skólaráðinni í hausti ed var. Þeir nýu
setjast ætíð á haustin nedstir í þeim bekk, er þeir setjast í
svo sem óreyndir, nema í latínskum stíl.

Nú þeirra reglulegu lærifveina, nutu hjá oss fríkénslu
7 aukalærifveinar, 1 med Efrabekkingum, en hinir med
Nedrabekkingum, med sama stilyrði sem þvílíkum hafa verid
sett síðan ár 1840, nefnilega: ad þeir hvad rúm í skól-
anum snertir, séu ekki til boga hinum reglulegu lærifvein-
um, og sjái sér sjálfir fyrir sæði, þjóuustu og odhjúkrun;
hvorsvega sumir af þessum 7 hafa hlotid ad koma sér til
húsa og allrar odhjúkrunar fyrir á ødrum bæum; en standa
þó ad ødru leiti í øllu undir sömu lögum, sem skólans
reglulegu lærifveinar, sem vér álitum nauðsynleg ad á:

filja, svo þeir ekki gérdu trublan í skóla stjórninni; þad er líka þeim sjálfum til góds.

Ræð Skólalærifveinanna haustid 1844 vorð þessi:
 I, 3 Efrabekk: 1) Jón Jónsson. 2) Gísli Brin-
 júlfsen. 3) Eiríkur Jónsson. 4) Oddur Zallgrims-
 son. 5) Jónas Thorstenssen. 6) Benedikt Grøndal.
 7) Steffán Thorderfen. 8) Þórdur Thorgrimsen.
 9) Magnús Gíslason. 10) Jón A. Blóndahl. 11)
 Bogi Thorarensen. 12) Sinnur Þorsteinsson. 13.
 Jóhann Kn. Benediktsfon. 14) Jón Sigurdsfon.
 15) Þorvaldur Þodvarsfon. 16) Oddur Sveinsfon.
 17) Gunnlaugur Guttormsfon¹. 18) Benedikt
 Kristjánsson. 19) Magnús Thorlacius. 20) Páll
 Jónsson. 21) Þórdur Jónassen. 22) Steffán
 Gudnason. 23) Jón Snæbjærnsfon. 24) Páll Fridr.
 Vídalín. 25) Arni Thorsteinfon. Nr. 18 — 23
 voru í haust teknir úr Nedrabekk uppí Efrabekk, eu 24
 og 25 komu fyrst til skólans í haust (1844) og voru sem
 óregndir, nema í latínskum stíl. settir uedstir í bekkinn.
 II, 3 Nedrabekk: 1) Zannes Sínfon. 2) Bjarni
 Thorlacius. 3) Magnús Grimsfon. 4) Brinjólfur
 Jónsson. 5) Jón Sínsen. 6) Jón Þórdarfon.
 7) Fridrik B. Thorarensen. 8) Bergur Jónsson.
 9) Jóhannes Zaldórsfon. 10) Zelgi Zálfdánarfon.
 11) Jakob Gudmundsfon. 12) Sveinn Skúlafon.
 13) Gudbrandur Vigfúsfon. 14) Zaldór Gudmunds-
 fon. 15) Þorfinnur Jónatansfon. Nr. 10 — 15 í

¹) Þessi lærifveim hindrabist af sjúkdómi, að koma í þetta sinn
 til skólans, hvors vegna pláts hans var veitt í vetur Jóni Þor-
 vardarsyni, en slunnsa, skólalærifveini Jóni Snæbjærnar-
 syni, hvors géitid er hér á undan.

Uedrabekff vóru fyrst í haust (1844) inntekur í skólanum og þess vegna settir neðstir. En þessi varð røð Lærisveinanna í báðum bekkjum eptir sem þeim tókst í yfirheyrslunni þann 8 — 11 Jan. 1845. A, I Efrabekff: a) 1) Gísli Þrinjúlvsen. 2) Jón Jónsson. 3) Oddur Gallgrímsson. 4) Finnur Þorsteins-son. 5) Þórdur Thorgrímsson. 6) Magnús Gíslason. 7) Jón Sigurðsson. 8) Oddur Sveinsson. 9) Þorvaldur Þóðvarsson. Þessum 9 var suemma sprit Jól fyrirsett að búa sig undir eptir Nýhárid að yfirheyrast í meiru og fleiru enn því, sem lesid var í skólanum frá Oct. 1844 framman Jólum, og tiltökum vér hvad mikid vera skyldi, þaræð vér ætludumst til, að vér á því hvernig þeir í yfirheyrslunni skydu sig, mundum sjá, hvert þeir færir mundu verda til að útskrifast á næstkomandi vori, því allir vóru þeir búinir að yfirfara nóg til þess í skólanum; og þaræð vér eptir yfirheyrsluna álitum þá fara þar til, vóru þeir settir essir, svo sem þeir er hysdu verid yfirheyrdir í meiru og fleiru enn hinir lærisveinarnir í Efrabekff, og var þeim því nidurradad útaf sprit sig.

b) En hinna Efrabekkinga røð varð þessi: 1) Eiríkur Jónsson. 2) Steffán Thorderson. 3) Benedikt Grøndal. 4) Benedikt Kristjánsson. 5) Jón Aud. Blondahl. 6) Bogi Thorarensen. 7) Johan Kn. Benediktsson. 8) Jónas Thorstensson. 9) Steffán Gudnason. 10) Páll Jónsson. 11) Magnús Thorlacius. 12) Þórdur Jónassen. 13) Jón Snæbjørnsson. 14) Arni Thorsteinsson. 15) Páll Fridr. Vidaliu. B, I Uedrabekff: 1) Jakob Gudmundsson. 2) Hannes Chr. St. Sinsen. 3) Helgi Gálfðánarson. 4) Sveirn Skúlason. 5) Magnús

T a f l a

um það, hvornig þeim, sem útskrifaft úr Bessastada Skóla, í hversri lærðómsgrein út af fyrir sig tekist hefir í því opinbera lærðómsprófi þann 22 — 24da og 26 — 27da Maí 1845.

No. Nöfn hinna útskrifðu.	Latína.	Lat. Stíl.	Griška.	Danška.	D. Stíl.	Tal. Stíl.	Hebreška.	Utskrif.	Latína- lærd.	Beitalarf.	Latína- fræði.	Máttáls- fræði.	Latína- fræði.	Höfund- tala.
1. Gíslí Brynjólfsson.	ág.	dáv.	ág.	ág.	ág.	dáv.	ág.	dáv.	ág.	ág.	ág.	ág.	ág.	103.
2. Jón Jónsson.	ág.	dáv.	dáv.	ág.	dáv.	dáv.	ág.	ág.	ág.	ág.	ág.	ág.	ág.	101.
3. Oddur Hallgrímsson.	vel.	vel.	dáv.	dáv.	famíl.	vel.	ág.	dáv.	ág.	dáv.	ág.	ág.	ág.	88.
4. Sinnur Þorsteinson.	dáv.	vel.	dáv.	dáv.	famíl.	vel.	ág*.	dáv.	vel.	ág.	ág.	ág.	ág.	87.
5. Magnús Gíslason.	vel.	vel.	dáv.	dáv.	dáv.	vel.	ág.	dáv.	dáv.	vel.	ág.	famíl.	ág.	84.
6. Þórdur Þorgrímsson.	dáv.	vel.	dáv.	dáv.	dáv.	vel.	ág*.	dáv.	vel.	vel.	ág.	famíl.	vel.	82.
7. Jón Sigurðsson.	dáv.	vel.	vel.	vel.	vel.	vel.	dáv.	dáv.	dáv.	vel.	ág.	vel.	ág.	82.
8. Oddur Sveinsson.	vel.	vel.	vel.	dáv.	vel.	vel.	ág.	vel.	vel.	dáv.	ág.	dáv.	ág.	81.
9. Þorvaldur Þodvarsson.	dáv.	vel.	famíl.	vel.	vel.	vel.	dáv.	famíl.	vel.	famíl.	ág.	dáv.	lafl.	72.

Athugasgr. Stjarnan (*) þýðir, að Griška er lesin í Hebreška stad.

Bessastada Skóla þann 27da Maí 1845.

Steingrímur Jónsson.

Á. Helgason.

H. G. Thordarsen.

J. Jónsson.

H. Scheving.

S. Egilsson.

B. Gunlögsen.

R a f l a

um það, hverjig Þeósaftada Skólalærþeimni, er eptir eru, hefir tekið hverjum út af fyrir sig í því opinbera lertómsprófi þann 22—24da og 26—28da Maí 1845.

1. E f r i Þ e k k u r .

No.	Lærþeimna nafni	Latína.	Lat. Stíll.	Gríffa.	Danfsa.	D. Stíll.	Lat. Stíll.	Græffa.	Uffr. R. L.	Arðarskerð.	Beralldarf.	Handsk. fræði.	Rámmátsfræði.	Zalmsfræði.	Öfubtala.
1.	Lirkur Jónson.	ág.	vel.	ág.	ág.	semil.	„	ág.	ág.	ág.	ág.	ág.	ág.	„	87.
2.	Stephán Thordersen.	ág.	vel.	dáv.	ág.	semil.	„	ág.	ág.	ág.	ág.	ág.	ág.	„	85.
3.	Jón Audun Blondahl.	ág.	vel.	dáv.	ág.	semil.	„	ág.	ág.	ág.	ág.	ág.	ág.	„	85.
4.	Benedikt Gröndal.	ág.	dáv.	dáv.	ág.	semil.	„	vel.	ág.	dáv.	ág.	ág.	ág.	„	84.
5.	Jóhann K. Benediktss.	dáv.	vel.	ág.	ág.	semil.	„	ág.	ág.	ág.	dáv.	ág.	ág.	„	83.
6.	Benedikt Kristjánson.	dáv.	vel.	dáv.	dáv.	semil.	„	ág*.	ág.	ág.	ág.	ág.	ág.	„	82.
7.	Jón Snabjörnsen.	dáv.	vel.	ág.	ág.	semil.	„	ág*.	dáv.	dáv.	ág.	ág.	ág.	„	82.
8.	Jónas Thorstensen.	vel.	semil.	dáv.	„	semil.	„	„	„	ág.	„	ág.	bard veifur.		
9.	Stephán Gudnason.	dáv.	vel.	dáv.	ág.	semil.	„	ág*.	dáv.	ág.	ág.	ág.	dáv.	„	78.
10.	Magnús Thorlacius.	dáv.	vel.	dáv.	dáv.	semil.	„	dáv.	dáv.	dáv.	ág.	ág.	ág.	„	78.
11.	Bogi Thorarensen.	dáv.	vel.	vel.	vel.	semil.	„	vel.	ág.	ág.	ág.	ág.	ág.	„	77.
12.	Páll Jónson.	vel.	vel.	dáv.	ág.	semil.	„	ág.	ág.	dáv.	ág.	dáv.	dáv.	„	77.
13.	Pórdur Jónasen.	dáv.	vel.	dáv.	dáv.	semil.	„	vel.	dáv.	dáv.	dáv.	ág.	ág.	„	76.
14.	Arni Thorsteinson.	dáv.	semil.	dáv.	ág.	semil.	„	ág*.	vel.	dáv.	ág.	ág.	ág.	„	76.
15.	Páll Vídalín.	var veifur badi fyrir og undir yfirhefningu.													

2. H e d r i Þ e k k u r .

No.	Lærþeimna nafni	Latína.	Lat. Stíll.	Gríffa.	Danfsa.	D. Stíll.	Lat. Stíll.	Græffa.	Uffr. R. L.	Arðarskerð.	Beralldarf.	Handsk. fræði.	Rámmátsfræði.	Zalmsfræði.	Öfubtala.
1.	Jakob Gudmundson.	var rámsastur vegna fínaveifi nóstum því allan upplesrar tíman.													
2.	Sannes Chr. St. Sinsen	dáv.	vel.	ág.	ág.	dáv.	dáv.	ág*.	„	ág.	ág.	ág.	„	ág.	86.
3.	Sveinn Stúlaason.	ág.	vel.	ág.	dáv.	vel.	vel.	dáv.	„	ág.	ág.	ág.	„	ág.	84.
4.	Selgi Kálfðánarson.	ág.	vel.	dáv.	ág.	vel.	dáv.	dáv.	„	ág.	ág.	ág.	„	dáv.	83.
5.	Hjarni Thorlacius.	ág.	vel.	ág.	dáv.	vel.	dáv.	dáv.	„	dáv.	dáv.	ág.	„	dáv.	81.
6.	Magnús Grimsen.	dáv.	vel.	dáv.	dáv.	vel.	dáv.	dáv.	„	ág.	dáv.	ág.	„	ág.	80.
7.	Gudbrandur Vigfúss.	ág.	semil.	vel.	dáv.	vel.	dáv.	ág.	„	ág.	ág.	ág.	„	dáv.	78.
8.	Kaldór Gudmundson.	dáv.	vel.	dáv.	ág.	semil.	vel.	dáv.	„	dáv.	ág.	ág.	„	ág.	78.
9.	Þrinjúlfr Jónson.	dáv.	vel.	dáv.	dáv.	vel.	vel.	dáv.	„	dáv.	dáv.	ág.	„	ág.	77.
10.	Jón Const. Sinsen.	vel.	vel.	dáv.	ág.	vel.	vel.	dáv.	„	dáv.	vel.	ág.	„	ág.	75.
11.	Jón Þórðarson.	vel.	vel.	vel.	dáv.	semil.	dáv.	dáv.	„	dáv.	dáv.	ág.	„	ág.	73.
12.	Jón Þorvarðarson.	vel.	vel.	dáv.	dáv.	vel.	vel.	vel.	„	vel.	dáv.	ág.	„	dáv.	71.
13.	Þorsinnur Jónathans.	„	vel.	vel.	dáv.	semil.	vel.	„	„	vel.	„	dáv.	bard sjáfur.		
14.	Seidrið B. Thorarensen.	vel.	vel.	vel.	vel.	vel.	vel.	dáv.	„	vel.	semil.	ág.	„	ág.	68.
15.	Bergur Jónson.	vel.	vel.	vel.	vel.	semil.	semil.	vel.	„	vel.	vel.	dáv.	„	ág.	66.
16.	Jóhannes Kaldórson.	vel.	semil.	vel.	vel.	vel.	vel.	vel.	„	vel.	vel.	dáv.	„	ág.	64.

Atþugagr. Stjarnan (*) þýðir, að Gríffa er lesin í Hebreffa stad.

Þeir sem sjáfir urðu eru látnir halda sínu gamla satti, þessum í þetta sínu dreyndir eða hálfreyndir.

Þeósaftada Skóla þann 20da Maí 1845.

Steingrímur Jónsson.

J. Jónsson.

H Scheving.

S. Egilsson.

B. Gunlögsen.

Grímsfon. 6) Guðbrandur Vigfússon. 7) Galdór Guðmundsson. 8) Jón, C. Sinsen. 9) Brinjólfur Jónsson. 10) Jón Þorvarðsson. 11) Þjarni Thorlacius. 12) Jón Þórdarson. 13) Þorfinnur Jónatansson. 14) Jóhannes Galdórsson. 15) Bergur Jónsson. 16) Fridrik Þjarnason Thorarensen.

Þvornig þessi ræð breittist við þá opiðberu yfirsýrslu í skólanum þann 22 — 28 Maí þ. ár, sýnir Taflan B í tilliti til þeirra sem útskrifudust, og Taflan C í tilliti til þeirra, sem eptir urðu í skólanum; hvörjar Taflur líka sýna hvernig, í hverri lærdómsgrein útaf fyrir sig, sérhverjum lærisveini hefir tekist.

Þinir sömu hafa verið skólans féunarar þetta árið sem mörg undanfarin; en hvað hvort þeirra hefir þar féunt segir hér sérhvort frá sjálfur.

1) Lector Theol. Jón Jónsson. Eg hefi féunt, A, 3 Kristilegrar trúarlærdómi: a) 3 Efrabeff þyrj: adi eg þar sem eg hafði hætt við í fyrra, uefnilega: að útlýsta fyrir lærisveinunum hinar sérdeilislegu skyldur; Þó tók eg ekki fyrir mig að útlýsta fleiri af þeim enn gétid er um í Meyers lærdómsbók, og ríffadi á undan fyrir lærisveinunum stuttlega það, sem eg í fyrra hafði féunt um maunsins náttúruædli og hinar almennu skyldur, til þess að gjöra glöggara fyrir þeim í hverju sambandi sérdeilis skyldurnar væru við þær almennu. Ad því búnu hélt eg áfram um útlýsta 4da atriðid í 2 kap. í Fogtmanns lærdómsbók, og síðan 3ja kap. allan, og seinast 4da kap. §§ 144—151. Þar sem mér helst þókti þess þurfa bætt eg við sögu víðsra lærdóma (dogm. hist.), svo þeim yrði

skiljanlegra hvornig það væri tilkomid, ad vissir lærdómar
 hafa feingsd þá lögum er þeir nú hafa, t. a. m. lærdóm
 urinn um syndina, forlíkunina, Krists 2 náttúru, trúna,
 góðverkin, réttlætislaguna, sakramentin. b) *J Nædrabekki*
 yfirfor eg „Bohrs leidarvísir í trúarlærdómi fyrir nedri-
 bekki lærdra skóla“ §§1—82 eda ad stjldunum vid adra.
 Þegar eg var búinn ad útlísta 1 til 4 §§ í bókinni, eptir
 sem þeir vóru efnis ríkir, hefi eg spurt út úr þeim daginn
 á eptir, eda þá næsta dag, ef ad svo hefir á stadid, ad
 lærifveinarnir hafa átt ad yfirheyraft í mörqu hjá oss sama
 daginn, til þess ad lærifveinornir neyddust ekki ad kasta
 höndum til neins sem þeir áttu ad leyfa af heudi; því
 illa í þessháttar höfum vér kénararnir lagad oss hvorr eptir
 ödrum. Og hér í hefi eg hagad mér líkt í báðum bekkj-
 um. B, *J N. T.* hefi eg þetta skólaár útlístað fyrir *Efra-*
bekkingum 15 og 16 kapp. *Markúsar Gudspjalls* og fyrra
 bréfid til Korintumanna, nema 16da kapp. C, *J Hebreflu*
 hefi eg: a) med *Æfribeckkingum* yfirfarid kapp. 6—20 í
 í *Genesis*, nema 10 og 19 kapp., sem ekki er vant ad lesa,
 allt grammaticæ, og einungis gérid um fáteitt, er þenadi til
 skilnings á því lesna í öðru tilliti. b) *J Nædrabekki*,
 fyrir utan þá mér fyrirskrifudu tíma, hverja má sjá af
Lestrartöblunni, sem stendur í skriflu m: ár 1840—1841
 vid bls. 13, hefi eg yfirfarid það helsta af *Lindbergs*
hebreflu málfrædi med flestum *Nædrabekkingum* og 1 af auk-
 lærifveinum. Einungis 2 af þeim reglulegu lærifveinum sem
 hebreflu hafa (fáeinir ætla sér ad lesa gríflu í hebreflu-
 stad), höfdu ekki séð hebreflu bófstaf ádurenn þeir komu í
 skólan; þeim hefi eg orbid ad kénna út af fyrir sig en hinum
 hefi eg hlýdt yfir málfrædin í stórum töblum ásamt med þess-
 um tveimur. Loksins las eg analytice med þeim öllum

nokkur vers í 3 kap., þar sem eg hætti vid í fyrra. D, Hefi eg lagfært Efrabekkinga dönsku stíla 2svar í viku; í annad skiptid alla, en hitt skiptid helming á móti Dr. S. Egilsen. Efnid til stílanna var framan af íslenskt, en eptir nýárid tekid úr Ciceronis: Cato major. Einusinni í vetur hefi eg látid Efrabekkinga svara skriflega uppá spurð: mál sem eg fyrirlagdi þeim úr gudsræðinni, og hagadi eg mér ad sluleiti þar í eins og eg hefi géttid um í skriflu m. fyrir ár 1842—1843 bls. 11.

2) Dr. Philos. S. Scheving. Eptir það ad eg, eins og ad undansöfnu, hafdi látid Nedrabekkingar lærisveina yfirfara, eptir Madvigs lat. málfræði, hinar latínsku nafna og sagna breytingar aptur ad „Orddannelses Læren“, las eg 1) í Nedrabekki Cæsars bell. Gall. 1—5 bóki, og Virgilii Æneis 3 bókur, 1. 2 og 3. 2) í Efrabekki Ciceronis officia vll, Horatii Epist. 1 og 2ra bóki ásamt arte poetica. Latínska stíla hefi eg lagfært í báðum bekkjum eins opt hvorja viku og eins marga, eins og ad undansöfnu.

3) Dr. Theol. Sv. Egilsen. Ad aðlokinni skóla: setningu vid byrjun Októbermánaðar, lét eg Nedrabekkingar lærisveina, eins og eg hefi verid vanur, glæggva sig á hin: um helstu orða breytingum hiunar grísku tungu, eptir þeirri grísku málfræði, sem Lange gaf seinast út; hafdi fremri hluti hennar, sem er meiri hluti orðafræðinnar, verid send: ur til skólans ad tilhlutan háskólastjórnarráðsins. Því næst yfirfór eg fjórdu bóki Senósons Anabasis, tók svo til á þriðju bókinni, en komst þar ekki leingra enn út 12tu grein í 4da kap. Naunar í fyrstuuni hafdi eg ætlad ad lesa Zeródót; með því og ad það, sem útkomid var af Langes málfræði, nádi ekki svo langt, ad eg gjæti vissad lærisvein: um þar á aðalbreitingu Jónsku þeirrar, er tíðkast í Zeró:

dótt. Jafnframt þessu hlýddi eg lærisveinum yfir, koblum saman, það sem eg hafði yfirfarid. Álf þess leidrétti eg latínsta stíla hjá tveimur hlutum bekkjarins einufinni í viku hverri. Með Efrabekkljar lærisveinum las eg á sama hátt *Timon* og 9 samtöl í *Dialogis mortuorum*, eptir útgáfu Tauchnitz, Leipz. 1829, sem og tvær fyrstu bækur af *Homeri Ilias* (útg. af C. F. Ingerslev, Kbhfn 1830), að undantektu flípa og kappatalinu í annari bókinni. Dönsku lögdu lærisveinar sjálfir út, og leidrétti eg þýðinguna hjá heim, þar sem mér þótti þörf á, svo þeir kæmst að meiningunni; það var í flórs dönsku lestrarbók, bls. 133 — 153 og bls. 198 — 230. Danstkan stíl leidrétti eg hjá helmíng þeirra einufinni í viku. Læriseinar í báðum bekkjum kynntu sér *Frakklands sögu frá dauda Lodvíks konungs 14da* og út, *Englands sögu alla*, og af fornalds arfögunni um ríkin í *Asíu*, fyrir daga *Sýrúsar gamla*; rík in í *Afríku*, *Gríkklands sögu*, sem og einvaldsdæmi *Persa* og *Masedóna*; allt eptir ágripi þinnar almennu veraldar; sögn af S. N. Kofod, Kbhfn. 1842.

4) Björn Gunnlaugsson, kennari skólans. Þetta lídna skólaár 1844 — 1845 yfirfór eg í skólanum: 1) eptir Velschov í báðum bekkjum Landaspunarfrædi; löndin Spán, Portúgal, Frakkland, Ítalíu og Sveitðalönd, og fór að því lítt og í fyrra. 2) Hjá Efrabekkljum yfirfór eg Rúmmálsfrædi eptir Svénningssen, 6 kap. af 8. Eg gat ekki lofid við hana, því hún er að setninga sjölda nærri tvöfalda svo mikil, sem rúmmálsfrædi Ursíns. Sum ar setningar í henni þursa og lánga útsíringu. Svénningssens rúmmálsfrædi er því hentugri þar, sem fleiri eru bekkir en hér í Skólanum. 3) Í Medrabekkl yfirfór eg Talnalist eptir Ursíns reikningabók, með sömu aðferð

sem undanfarin ár: 4 reiknings tegundir í heiltu og brottu, vidféndum og óvidféndum tölum, þrítíu heiltu og brottinna talna, æfuga þrítíu, rétta og æfuga tvöföldu reglu, einnig Keisar reglu. Þeir sem leingra eru komnir í reikningi, þjófóru líka arfastipti og tugabrot. 4) Þjófór eg med læriseinum í nedra bekk í Rahbeks Vestrarbókar. 2ru bindi; Abilgaards rædu eptir Bernstorff, Kierúlsfs rædu eptir Tyge Rothe, Thaarups rædu eptir Suhm; ljóðada sorgarleiki: af Jóhannesi Ewald, um Baldurs dauda; af Bruun, um Einar Þambastélfir; af Pram, um Damon og Pythias, og af Oehlenschläger um Hákon Jarl. 5) Loksins hefí eg lagfært stíla eins og ad undanfornu.

Þingad til hefir hid konúnglega Háskóla = Stjórnarráð ekki einungis sendt árlega bækur til bókahyrdslu Vefsastada skóla, heldur líka árlega sidan 1819 naudsýnlegar bækur til skólans læriseina, er þeir hafa feingid fyrir nidursett verd, allt ad $\frac{1}{3}$ parti verds þeirra, sem var ekki lítill velgjörningur, alla heist fyrir þá, sem fáum eru kunnugir og fátækir, sem margur þeirra er, og á medal þeirra margir, sem fremur øðrum eru efnilegir. Adur enn Háskóla Stjórnarráðid sýndi Læriseinum þenna velgjörning, fóru margir, sem frá Skólanum útskrifadust, eins bóka snaudir þá þeir skildu vid hann, eins og þeir vóru, þá þeir fyrst vóru til skólanna sendir; og er þá audsýnd, hvad ørdugt þeim munt hafa veitt, ad framhalda bólkmentum sínum, jafnvel ørdugt ad vidhalda því, sem þeir í skólanum høfdu numid. En hid konúnglega Stjórnarráð lét ekki lenda vid þenna velgjörning, heldur med brefi dagsettu 22an Apr. 1819, til Stiptamtmannsins og

Biskupsins, gaf leifi til þar fyrir utan, að mætti eptirgefna þar að aul í bókaverði ómílsauleguðu bóka, meira eins stökum Lærisveinum, sem bláfátækir væru, og hefir síðan á hverju ári þvílíkur bókakaupsstíkur verið gefinn einstökum, er eg hefi mælt frammi með, sem numid hefir alls árlega frá 20 til 30 ritibáukadölum. Eptir þessu gefna leifi veitti Stiftid þetta skólaár með bréfi frá 30ta Nóv. f. á. eptirfylgjandi fátökum lærisveinum að upphæð 21 rddl. 20 sk. í meðtekinna bóka verði, nefnilega:

1. Gudbrandi Vigfúsusyni 1 rddl. 56 sk.
 2. Þorfinni Jónatanssyni 6 — 28 —
 3. Magnúsi Grímsyni . 5 — 47 —
 4. Jóni Þórðarsyni . . 4 — 22 —
 - og 5. Zannesi Sinsen . . . 3 — 58 —
- 21 rddl. 20 sk.

En af bréfi þess konunglega Háskólastjórnarráðs (den Kongelige Direction for Universitetet og de lærde Skoler) til Stiptistins af 28da Maf f. á., hafa menu nú orsök að ótast, að hid nýnefnda konunglega Stjórnarrád ekki einungis hætti að tryggja skólans bókahirdslu og skólans lærisveinum fyrir þeim nauðsynlegu bókum — til þess gæta og fundist ráð að þær gæti feingist hér — heldur og að ekki framar nidursetjist bókaverdid. Sumir af lærisveinum um hafa líka allt af verid svo efnugir, að þeir þurftu þess ekki nauðsynlega við að fá léttir í bókaverdinu. Sorglegast er, ef af þeim fátækustu verður aldeilis lippt þeirri gjöf af skólans fjöð, sem þeir hingad til árlega hafa feingid, og eg gat um hér að ofan, til að gæta eignast hinar allranaudsynlegustu skólabækur, því það er eins og að taka hamarium og oxiaa frá smidnum. Eg skrifaði því Stiptinu þann 20ta Febr. þ. á. og mældist til, að það feingi einhveru

Þ f i r h e y r s l a n

i Þ e s s a s t a d a s t ó l a

frammfer í þessari rób þann 22—28 maí 1845.

Sunnudag	f. m.	8 — 10	Éb.	læriveinar	reynast	í latínu.
		10 — 11	Db.	—	—	í landafræðingurfræði.
		11 — 12	Éb.	—	—	í kristilegum trúarlærdómi.
Söstudag	e. m.	2 — 6	Éb., Db., og Þeir,	sem útskr., r.	í	latíniskum stíl.
	f. m.	8 — 10	Éb.	læriveinar	reynast	í grísku.
		10 — 11½	Db.	—	—	í kristilegum trúarlærdómi.
Laugardag		11½ — 12	Éb.	—	—	í landafræðingurfræði.
	e. m.	2 — 6	Éb., Db., og Þeir,	sem útskr., r.	í	dönskum stíl.
	f. m.	8 — 10½	Db.	læriveinar	reynast	í grísku.
Mánudag		10½ — 12	Éb.	—	—	í stílningi N. T.
	e. m.	2 — 3½	Db.	—	—	í dönskum.
		3½ — 6	Db., og Þeir,	sem útskr., r.	í	íslenskum stíl.
Þýsdag	f. m.	8 — 10¾	Db.	læriveinar	reynast	í latínu.
		10¾ — 12	Éb.	—	—	í veraldarsögnum.
	e. m.	2 — 3½	Þeir,	sem útskrifað,	reynast	í latínu.
Friddag		3½ — 5	—	—	—	í grísku.
		5 — 6	—	—	—	í hebreysku.
	f. m.	8 — 9	—	—	—	í dönskum.
Mikudag		9 — 9½	—	—	—	í landafræðingurfræði.
		9½ — 10¾	—	—	—	í kristilegum trúarlærdómi.
		10¾ — 12¼	—	—	—	í reiknagálist og rúmmálsfræði.
Fimmtudag	e. m.	2 — 3¼	—	—	—	í veraldarsögnum.
		3¼ — 4½	—	—	—	í stílningi N. T.
		4½ o. f. frv.	dómur lagdur	á framfarir þeirra,	sem útskrifað eiga.	
Föstudag	f. m.	8 — 9¼	Db.	læriveinar	reynast	í veraldarsögnum.
		9¼ — 11	Db.	—	—	í reiknagálist.
		11 — 12	Éb.	—	—	í dönskum.
Söndur	e. m.	2 — 3½	Éb.	—	—	í rúmmálsfræði.
		3½ — 6	Éb., og Db.	efri hluti	—	í hebreysku.

Afhugagrein. Af aukalæriveinum stólsins verður 1 reyndur með esribekkingum, enn hjólr með nedribekkingum.

Því er þá, að þýrheyrslan er á enda, verða atkvæði samantarín, og dómur lagdur á, hounig hounum lærivein, þeirra sem því verða, þessu tektist í þetta sinn, og tabla um þá samín, sem fylgja Stólsheyrslunni.

ÞessastadaStóla þann 24da apríl 1845.

áreiðanlegan mann til að taka á hendur að verða bóka-
 seljari í Reykjavík, og að honum gærdi það að skyldu, að
 hafa til sölu allar nauðsynlegar bækur fyrir skólann; en til
 endurgjalds leiddi honum — því eg vildi að hann seldi bæk-
 urnar fyrir Kaupmannahafnar bóksölu verð, og léti sér nægja
 með þæ 2 prócentur sem bókasælumennirnir í Kaupmanna-
 höfn gefa sínum fulltrúum í Stettlönðunum — að selja all-
 slags bækur, og þæred bókasalan tóm naumast mun sæða
 sinn mann í Reykjavík, mældi eg til, að bókasalan mein-
 adi honum ekki annars slags kauphöndlan eða atvinnuveg.
 Eg mældi og til að bækur til skólans mættu flýstjast
 kauplaust með póstkípinu. Líka gat eg þess í áminnsu bréfi,
 að nauðsynlegt mundi vera, að skólans Rector eða skóla-
 ráðið léti bókaseljaran árið á undan vita, af hvorjum bóka-
 um mundi vera nauðsynlegt að hafa forða næsta ár.

Leidváttingar.

í leidarvísínum til að þekkja stjörnur.

- Bis. 13 línu 9, halla, les: halda.
 — 31 — 28, gánga hátt, les: gánga álitka hátt.
 — 52 — 2, veit les: vitum.
 — - — 18, er, les: og.
 — 54 línu 9, þeir síðari 32 eiga að útskrifa.
 — - — 25, eda, les: er.
 — 64 — 18, Alginib, les: Algenib.
 — 65 — 25, $\frac{5}{65}$, les: $\frac{5}{68}$.
-







